



МЕНИНГЕАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ

ПОДГОТОВИЛА ШАПОШНИКОВА А.А. 1.4.15А

КУРАТОРЫ: К.М.Н., ДОЦЕНТ ЧУКАНОВА А.С.; АСПИРАНТ 2-ГО ГОДА, ВРАЧ-НЕВРОЛОГ РАДИОНОВА Д.М.

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
СНК Кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ЛФ


МЕНИНГЕАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ

СИМПТОМЫ НАТЯЖЕНИЯ

1. Ригидность мышц затылка
2. Симптом Кернига
3. Три симптома Брудзинского
 - а) верхний
 - б) средний
 - в) нижний

РЕАКТИВНЫЕ БОЛЕВЫЕ ФЕНОМЕНЫ


1. Симптом Пулатова
2. Симптом Бехтерева
3. Симптом Менделя
4. Пальпация мест выхода
n.trigeminus
5. Надавливание на глазные яблоки



Ригидность мышц затылка



Симптом Кернига



Верхний




Средний



Нижний


Симптомы Брудзинского



Симптом Пулатова



Симптом Бехтерева



Симптом Менделя



**Пальпация мест выхода
n.trigeminus**



**Надавливание на глазные
яблоки**



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
СНК Кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ЛФ