ГБОУ СПОРО «РБМК»

ФИЗИОЛОГИЯ

МИКРООРГОНИЗМО

B

Подготовила: Фаикова София. Студентка 1 курса 3 группы Отделение: «Сестринское дело»

г. Ростов-на-Дону

Содержани

- •Химический состав бактериальной клетки.
- •Ферменты бактерий.
- Питание, дыхание, рост и размножение бактерий.
- •Питательные среды и их назначение, применение.
- Выделении чистой культуры бактерий.

Химический состав бактериальной

Вода – 70%, Сухое вещество - 30%, Белки - 52, полисахариды – 16, **Липиды** – 9,4, РНК – 16, ДНК **–** 3.2, неорганические соединения – 0,4. Потребность бактерий в химических элементах: Макроэлементы (органогены) 60% в CYMMe, C50, N14, H8, O20, микроэлементы - К, Ca, Mg, Na, S, P.



Ферменты

Ферменты — Сиологические катализаторы высокомолекулярной структуры, вырабатываемые живой клеткой. Они имеют белковую природу, строго специфичны и играют важнейшую роль в обмене веществ микроорганизмов. Специфичность их связана с активными центрами, образуемыми группой аминокислот. Ферменты позволяют некоторым микроорганизмам усваивать метан, бутан, другие углеводороды и синтезировать из них сложные органические соединения.



Питание, дыхание, рост и размножение.

Питание микробов осуществляется путем диффузии через оболочку и мембрану растворенных в воде питательных веществ.

По способу питания микроорганизмы разделяют на аутотрофные и гетеротрофные.

Аутотрофы способны синтезировать из неорганических веществ органические соединения. В качестве источника энергии для синтеза эти микробы используют световую энергию.


Гетеротрофы используют для питания в основном готовые органические соединения. Микробы, питающиеся органическими веществами отмерших животных или растительных организмов, называют **сапрофитами**. К ним относятся бактерии гниения, грибы и дрожжи. **Паратрофные** микроорганизмы, или паразиты, живут за счет питательных веществ живых клеток организма хозяина. К паратрофам относится большинство болезнетворных микробов.

Процесс окисления питательных веществ с выделением энергии называется дыханием.

По типу дыхания бактерии делятся на аэробные и анаэробные.

Аэробные микроорганизмы (аэробы) используют энергию, выделяемую при окислении органических веществ кислородом воздуха с образованием неорганических веществ, углекислого газа и воды. К аэробам относятся многие бактерии, грибы и некоторые дрожжи. В качестве источника энергии они чаше всего используют углеводы.


Анаэробные микроорганизмы (анаэробы) не используют для дыхания кислород, они живут и размножаются при отсутствии кислорода, получая энергию в результате процессов брожения. Анаэробами являются бактерии из рода клостридий, маслянокислые бактерии и др.






Размножение микроорганизмов происходит путем поперечного деления, почкованием, образования спор, репродукции. В процессе размножения микроорганизмы на различных этапах претерпевают морфологические и физиологические изменения (по форме, размерам, окрашиваемости, биохимической активности, чувствительности к физическим и химическим факторам и пр.).

Рост микроорганизмов означает увеличение массы микробов в результате синтеза клеточного материала и воспроизведения всех клеточных компонентов и структур.






Питательные

Питательные среды — субстраты, используемые в лабораторной практике для выращивания микроорганизмов и других биологических объектов. Рост микроорганизмов зависит от наличия в питательной среде достаточного количества органических и неорганических веществ в виде различных солей, витаминов и др. Питательные среды должны обладать также оптимальными физико-химическими свойствами: рН, вязкостью, влажностью, осмотическими свойствами.

К числу специальных питательных сред относятся следующие:

- 1. Элективные, или избирательные, и обогатительные среды.
- 2. Дифференциально-диагностические среды.
- 3. Синтетические питательные среды.







Выделение чистой

Чистой культурой называют такую культуру, которая содержит микроорганизмы одного вида. Выделение чистых культур бактерий - обязательный этап бактериологического исследования в лабораторной диагностике инфекционных болезней.

Выделение чистой культуры позволяет изучить морфологические, культуральные, биохимические, антигенные и другие признаки, по совокупности которых определяется видовая и типовая принадлежность возбудителя, то есть производится его идентификация.

Источник

http://dic.academic.ru

http://googleads.g.doubleclick.net

http://studopedia.net

http://biofile.ru

http://www.allvet.ru

Спасибо за внимание!!!