



A  
M  
E  
R  
I  
C  
A

# *Что такое аллергия?*

*Аллергия – это необычная повышенная чувствительность к различным веществам, которые у большинства людей не вызывают болезненных реакций.*



# Признаки аллергии



# Методы лечения аллергии



Иглоукалывание



# Лекарственная аллергия:





Аллергия является  
индивидуальной болезнью

## 8 основных пищевых аллергенов

			
<b>Корицко иолеко</b>	<b>Куриное яйцо</b>	<b>Арахис</b>	<b>Орехи</b>
			
<b>Соя</b>	<b>Моллюск</b>	<b>Рыба</b>	<b>Пшеница</b>



*В своей презентации я хотела бы рассмотреть самые необычные аллергены.*

# *Пищевая аллергия.*

*У людей с пищевой аллергией возникает ухудшение самочувствия после употребления определенных продуктов питания, которые у других не вызывают отрицательных реакций.*



# Пыль и аллергия.



**Основная болезнь, которую может  
вызвать пыль-это аллергия!**

Туберкулёз,  
столбняк,  
дифтерия,  
коклюш,  
бронхит.





# ХРАС, фибринозная форма.



**Укусы пчелы и осы очень болезненны.**

**Примерно 1-2 процента людей имеют  
аллергию на яд перепончатокрылых.**

**Даже если такого человека ужалило всего  
одно насекомое, последствия могут быть  
весьма тяжелыми.**



# **Реакции замедленного типа**


- **Аллергическая реакция III типа** (повреждение тканей иммунными комплексами — тип Артюса, иммунокомплексный тип).
- Возникает в результате образования циркулирующих иммунных комплексов, в состав которых входят IgG и IgM. АТ этого класса называют преципитирующими, так как они образуют преципитат при соединении с АГ. Этот тип реакции является ведущим в развитии сывороточной болезни, аллергических альвеолитов, лекарственной и пищевой аллергии, при ряде аутоаллергических заболеваний (СКВ, ревматоидный артрит и др.).

## **Синдром Стивенса-Джонсона**

- Наиболее тяжелая форма буллезной полиморфной эксссудативной эритемы, при которой наряду с поражением кожи наблюдается поражение слизистых, как минимум 2 органов**
- Причина – пенициллины, НПВС, антиконвульсанты**



*Анафилактический шок (АШ) -  
максимально тяжелое  
проявление аллергической  
реакции немедленного типа*



## 2. Отек Квинке



- Лекарственные препараты:  
пенициллин,  
салицилаты,  
сульфаниламиды  
, эритромицин,  
карбамазепин и  
др.

# Генерализованные проявления

## 1. Синдром Стивенса-Джонсона



- Лекарственные препараты:  
пенициллины, сульфаниламиды, противосудорожные, барбитураты, пиroxикам, алlopуринол, цефалоспорины, противотуберкулезные средства, НПВС и др.

## 7. Фотодерматит



- Лекарственные препараты-  
тетрациклин, амиодарон, производными фенотиазина, НПВС, гризофульвин.

# Генерализованные проявления

## 2. Синдром Лайелла



- Внешний вид напоминает ожог III степени. Эпидермальный некролиз.
- в каждом случае присоединение сепсиса.
- Летальность составляет 70—80%.

*Берегите Ваше здоровье!*



*Благодарю за внимание*