

### Состав

Одна таблетка, покрытая оболочкой, содержит:

Активное вещество: кеторолака трометамин - 10 мг

### Показания

Болевой синдром средней и сильной интенсивности различного генеза ( в том числе в послеоперационном периоде, при онкологических заболеваниях и др).

### Противопоказания

Повышенная чувствительность к кеторолаку или другим нестероидным противовоспалительным средствам, "аспириновая" астма, бронхоспазм, ангионевротический отек, гиповолемия (независимо от вызвавшей ее причины), дегидратация.

Аллергические реакции: редко - анафилаксия или анафилактоидные реакции (изменение цвета кожи лица, кожная сыпь, крапивница, зуд кожи, тахипноэ или диспноэ, отеки век, периорбитальный отек, одышка, затрудненное дыхание, тяжесть в грудной клетке, свистящее дыхание).

Препарат не применяют для обезболивания перед и во время хирургических операций из-за высокого риска кровотечения, а также для лечения хронических болей.

Условия отпуска из аптек  
По рецепту.

**КЕТАНОВ®**

**КЕТОРОЛАК**

Таблетки покрытые оболочкой

**10 МГ**

**100 ТАБЛЕТОК**



Болевой синдром средней и сильной интенсивности (в т.ч. при злокачественных новообразованиях, травмах, в послеоперационном периоде). Обезболивание при проведении болезненных диагностических или терапевтических мероприятий.

#### Противопоказания

Гиперчувствительность; состояния, сопровождающиеся угнетением дыхания или выраженным угнетением ЦНС (отравление алкоголем, снотворными ЛС, наркотическими анальгетиками и другими психоактивными ЛС); риск суицида, склонность к злоупотреблению психоактивными веществами, одновременный прием ингибиторов МАО (и период в течение 2 нед после их отмены), тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность, беременность (I триместр), кормление грудью (в случае длительного применения), детский возраст до 1 года (для парентерального введения) и до 14 лет (для приема внутрь).

#### Ограничения к применению

Опиоидная наркомания, нарушение сознания различного генеза, повышенное внутричерепное давление, ЧМТ (черепно-мозговая травма), эпилепсия, боль в брюшной полости неясного генеза (острый живот), нарушение функции почек и/или печени.

#### Передозировка

Симптомы: угнетение дыхания, вплоть до апноэ, судороги, сужение зрачка, анурия, кома.

Лечение: введение налоксона (специфический антагонист) в/в, промывание желудка, поддержание жизненно важных функ



Tramadol Hydrochloride capsules 50 mg

# ТРАМАДОЛ

**Обезболивающее средство**

Каждая капсула содержит:

Трамалол гидрохлорида ..... 50 мг

Республика Казахстан

ТОО «Доктор Улленс» совместно с

ТОО «Фармационка» РУС

г. Алматы, ул. Утемыра Байсары, 10