

Тема: Влияние применения цефазолина со стандартным лечением после операции у пациентов 30-60 лет с эмпиемой желчного пузыря.

*Выполнила: Утебаева У.А.
Проверила: Калбагаева Г.Х.*

Р — пациенты с эмпиемой желчного пузыря, 30-60 лет

І — стандартное оперативное лечение+цефазолин

С - стандартное оперативное лечение

О — осложнение (развитие разлитого перитонита)

Т — 2 лет

Цель:

*Изучить влияние стандартного
опер. леч. + цефазолин на
предупреждение возникновения
осложнения при эмпиеме
желчного пузыря в возрасте
30-60 лет.*

Задачи:

- *Отобрать пациентов с эмпиемой желчного пузыря в возрасте 30-60 лет*
- *Определить путем рандомизации 2 группы: одной группе оперативное лечение+цефазолин, второй оперативное лечение.*
- *Оценить клиническую эффективность препарата (частота возникновения разлитого перитонита).*

Дизайн:

*Экспериментальное
Контролируемое
Рандомизированное
Простое слепое*

Выборка

Генеральная совокупность – пациенты с диагнозом эмпиема желчного пузыря в возрасте от 30 до 60 лет.

Выборка

Стратифицированная

Этика исследования

- Одобрено КЭ
- Информированное согласие
- Имеют право отказаться от исследования в любое время
- Обе группы получают лечение
- Действие в интересах пациента
- Полезность для пациента и общества