

*Тема: Влияние применения цефазолина со стандартным лечением после операции у пациентов 30-60 лет с эмпиемой желчного пузыря.*

*Выполнила: Утебаева У.А.  
Проверила: Калбагаева Г.Х.*

*Р — пациенты с эмпиемой желчного пузыря, 30-60 лет*

*І — стандартное оперативное лечение+цефазолин*

*С - стандартное оперативное лечение*

*О — осложнение (развитие разлитого перитонита)*

*Т — 2 лет*

*Цель:*

*Изучить влияние стандартного  
опер. леч. + цефазолин на  
предупреждение возникновения  
осложнения при эмпиеме  
желчного пузыря в возрасте  
30-60 лет.*

## *Задачи:*

- *Отобрать пациентов с эмпиемой желчного пузыря в возрасте 30-60 лет*
- *Определить путем рандомизации 2 группы: одной группе оперативное лечение+цефазолин, второй оперативное лечение.*
- *Оценить клиническую эффективность препарата (частота возникновения разлитого перитонита).*

*Дизайн:*

*Экспериментальное  
Контролируемое  
Рандомизированное  
Простое слепое*

# Выборка

*Генеральная совокупность – пациенты с диагнозом эмпиема желчного пузыря в возрасте от 30 до 60 лет.*

Выборка

Стратифицированная

# Этика исследования

- Одобрено КЭ
- Информированное согласие
- Имеют право отказаться от исследования в любое время
- Обе группы получают лечение
- Действие в интересах пациента
- Полезность для пациента и общества