Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский базовый медицинский колледж»

Проведение СЛР одним спасателем

Работу выполнила:

Студентка 643 группы Селезнёва.А.М

Сердечно-легочная реанимация - это комплекс неотложных мероприятий, направленных на восстановление жизнедеятельности организма человека и выведение его из состояния клинической смерти.

ЭЛЕМЕНТЫ БАЗОВОЙ СЛР

- Установление факта ВОК (клинической смерти)
- Компрессии грудной клетки
- Обеспечение проходимости ДП простейшими методами
- ИВЛ экспираторным методом

Установление факта остановки кровообращения

- Отсутствие сознания
- Отсутствие дыхания
- Отсутствие пульса на сонных артериях



Реанимационные мероприятия не проводятся при:

-биологической смерти (трупные пятна, окоченение)

-травме, явно несовместимой с жизнью (отрыв головы от туловища)

-факте клинической смерти, установленной уже как 30-40 минут

Алгоритм оказания сердечно-легочной реанимации (СЛР):

1. При обнаружении человека без сознания необходимо оценить обстановку и попросить окружающих не толпиться вокруг пострадавшего.



2. Убедиться в наличии сознания – громко окликнуть пострадавшего и аккуратно встряхнуть за плечи.

3. Проверить наличие пульса на сонной артерии.

4. Аккуратно запрокинуть голову пострадавшего и поднести ухо к носогубному треугольнику для проверки дыхания (шум, тепло воздуха).

5. Назначить конкретного человека из толпы для совершения звонка в службу скорой помощи. Человек должен донести информацию следующего характера: на улице Менделеева у дома 33 лежит мужчина приблизительно 60 летнего возраста, без пульса и дыхания, начинаем сердечно-легочную реанимацию.



6. В момент звонка вы освобождаете пострадавшему грудь и живот от стесняющей одежды.

12. Сделать 30 (15) компрессий на грудину (с частотой более 80 компрессий в минуту) на глубину 4—5 см при счете «раз и, два и»... (нажимать на грудную клетку при счете «раз» и отпускать, когда произносится «и»). Сжимать и отжимать грудную клетку плавно, постоянно держать руки в контакте с грудной клеткой



7. Вы должны скрепить руки в замок и поставить основание ладони на середину грудины, выпрямить руки и работать по следующему алгоритму – 30 надавливаний и 2 вдоха (обязательно запрокидывать голову при вдыхании)



Реанимационные мероприятия заканчиваются при:

- установлении связи с пациентом
- по прибытии и передачи пострадавшего бригаде скорой помощи
- неэффективности в течение 30 минут

Благодарю за внимание!