

Уход за больными с заболеваниями органов мочевыделительной системы

доцент кафедры пропедевтики детских болезней с курсом поликлинической педиатрии, канд. мед. наук Капустина Наталья Руфимовна

Симптомы и синдромы при заболеваниях мочевой системы

- боль в поясничной области,
- синдром нарушения мочеобразования (полиурия, олигурия, анурия),
- дизурический синдром, включающий в себя болезненное и частое мочеиспускание,
- энурез,
- мочевой синдром.

Частота мочеиспусканий в детском возрасте

Возраст	Число испусканий	Возраст	Число испусканий
1 день	4-5	3 – 5 лет	10
до 6 мес.	20 – 25	7 – 8 лет	6-7
6 мес. – 1 год	15 – 16	10 — 14 лет	5-6

Суточный диурез

зависит от возраста и в среднем составляет:

- 1 мес 300 мл,
- 6 мес 400 мл,
- 1 год 600 мл,
- 1-10 лет применяется формула
 V = 600 + 100 (n 1),
 где n количество лет.

Объем разового мочеиспускания зависит от возраста и в среднем составляет:

- в 1-ом полугодии 30 мл,
- во 2-ом полугодии 60 мл,
- в 5 лет 100 мл,
- в младшем школьном возрасте 150 мл,
- в старшем школьном возрасте 250 мл.

Боль в поясничной области при:

- пиелонефрите,
- гломерулонефрите,
- травме почек,
- отхождении камней,
- карбункуле,
- опухоли почек.

Полиурия

 это выделение мочи выше нормативных показателей более, чем в 2 раза.

Полиурия возникает при:

- схождении отеков,
- хронической почечной недостаточности,
- в периоде разрешения острой почечной недостаточности.

Олигурия

 это уменьшение выделения кол-ва мочи за сутки до 1/3 от физиологической нормы.

Наблюдается при:

- острой почечной недостаточности,
- хронической почечной недостаточности вследствие уменьшения клубочковой фильтрации.

Анурия

• это снижение количества выделенной мочи до 5% или менее 1/15 от физиологической нормы, или полное прекращение мочевыделения в течение суток.

Дизурия

- это болезненное мочеиспускание,
 возникающее при:
- цистите,
- уретрите,
- туберкулезе,
- мочекаменной болезни,
- опухоли мочевых путей.
- Дизурия сопровождается поллакиурией увеличением частоты мочеиспусканий, может сопровождать полиурию.

- Энурез это недержание мочи, т.е. непроизвольное мочеиспускание. Такое явление считается нормальным до 1-1,5 лет. Энурез бывает ночной и дневной.
- Мочевой синдром это количественные и качественные показатели, полученные при исследовании мочи и процесса мочевыделения.

Уход за больными с патологией мочевыделительной системы

- Организация лечебно-охранительного режима
- Рациональная диетотерапия
- Гигиена тела при недержании мочи, энурезе
- Наблюдение за частотой мочеиспусканий и суточным диурезом

Исследование мочи

- Общий анализ мочи
- Анализ на скрытую лейкоцитурию и эритроцитурию
- Функциональные пробы Зимницкого и Реберга
- Бакпосев мочи

Инструментальные методы исследования

- УЗИ
- Обзорная рентгенография
- Экскреторная рентгенография
- Микционная рентгенография
- Эндоскопическое исследование

НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В УРОЛОГИИ

- Почечная колика
- Острая задержка мочеиспускания

Почечная колика

 самый частый симптом, наблюдающийся при ряде заб-ний почек.

Основные проявления:

- боли в поясничной области
- боли по ходу мочеточников.

Наиболее частые причины:

- мочекаменная болезнь в 70-75%,
- мочекислый диатез,
- гидронефроз,
- нефроптоз или уролитиаз.

Помощь при почечной колике

- 1. Вызвать врача через 3-е лицо.
- 2. Создать физический и психический покой.
- 3. Приложить теплую грелку на поясницу (если нет воспалительного процесса в почках).

Помощь при почечной колике

По назначению врача:

- 4. Горячая ванна на 10-20 мин
- 5. Введение спазмолитиков: но-шпа 2,0 в/м, папаверин 2% -2,0 в/м и др.
- 6. Введение анальгетиков: анальгина 50% 2,0 в/м, баралгина 5,0 в/м, промедола 1-2% -1,0 п/к.
- 7. В урологическом отделении:
- новокаиновая блокада семенного канатика у мужчин и круглой связки матки у женщин,
- внутритазовая новокаиновая блокада,
- катетеризация мочеточника,
- хирургическое лечение (литотрипсия с помощью УЗ, литотомия).

Острая задержка мочеиспускания (ишурия)

- невозможность опорожнить переполненный мочевой пузырь самостоятельно при позывах на мочеиспускание.
- Задержка мочи: острая и хроническая, неполная и полная. Причины задержки мочеиспускания:
- механический фактор закупорка уретры, мочевых путей изнутри или извне: камни, аденома и рак предстательной железы, травма уретры, склероз шейки мочевого пузыря, опухоли уретры или шейки мочевого пузыря, острый простатит, рак прямой кишки, опухоль шейки матки.
- не зависящими от состояния мочеполовой сферы: опухоли и травмы спинного мозга, истерия, хирургические операции, роды, послеродовый период, медикаментозные интоксикации, вынужденное длительное пребывание в постели, снижение тонуса детрузора.

Помощь при острой задержке мочеиспускания

- 1. Вызвать врача через 3-е лицо.
- 2. Создать физический и психический покой, изолировать пациента.
- 3. Применить рефлекторные приемы опорожнения мочевого пузыря:
- вызвать звук льющейся воды (открыть кран, переливать воду в стаканах);
- оросить половые органы теплой водой;
- сидячая теплая ванна;
- подать теплое судно.

Помощь при острой задержке мочеиспускания

По показанию врача.

- 4. Приложить теплую грелку на надлобковую область.
- 5. При отсутствии эффекта от рефлекторных методов
 - катетеризация мочевого пузыря (противопоказание
 - травма мочеиспукательного канала и мочевого пузыря).
- 6. Надлобковая пункция мочевого пузыря.
- 7. После процедур измерить количество мочи, визуально определить цвет, примеси.
- 8. Обеспечить наблюдение за пациентом, при необходимости промывание мочевого пузыря раствором фурацилина 1:5000, раствором риванола 1:1000.

