



# Панариций

Выполнила:  
студентка гр.30СД16  
Румянцева Татьяна

# Панариций


**Панариций** – острый гнойный воспалительный процесс, локализующийся в тканях пальцев рук (реже – пальцев ног) и возникающий на ладонной поверхности пальцев. Гнойные воспаления на тыльной поверхности пальцев к панарициям не относятся, за исключением процессов в области ногтя. Чаще всего заболевание развивается при проникновении микробов через ссадины и мелкие ранки, которые порой могут оставаться незамеченными.





# ПРИЧИНЫ

- Ссадины;
- Занозы;
- Мелкие порезы;
- Некачественный маникюр и педикюр;
- Вросшие ногти;



# Клинические проявления.

Симптомы панариция могут различаться в зависимости от формы заболевания. Тем не менее, при любых формах наблюдается ряд общих симптомов.

## На начальных стадиях панариция отмечается:

- покраснение,
- незначительный отек и
- слабые или умеренные болевые ощущения,
- возможно - жжение.
- отек увеличивается,
- боли усиливаются, становятся интенсивными, распирающими, дергающими, лишаящими сна.

## Формирование гнойника может:

- сопровождаться слабостью,
- утомляемостью,
- головной болью и
- повышением температуры тела.

## Симптомы

**интоксикации:** ярче выражены при глубоких, тяжелых формах панариция (костном, суставном, сухожильном).



# Лечение

Лечением панарициев занимаются хирурги. При поверхностных формах пациент может находиться на амбулаторном режиме, при глубоких необходима госпитализация. На ранних стадиях пациентам с поверхностным панарицием может быть назначена консервативная терапия:

-дарсонваль-это медицинский физиотерапевтический прибор, который действует на основе импульсного переменного тока малой силы, но высокой частоты и высокой мощности

-УВЧ-методика физиотерапии, в основе которой лежит воздействие на организм больного высокочастотного электромагнитного поля

-тепловые процедуры-это физиотерапевтический метод, или тепловая терапия.

На поздних стадиях поверхностного панариция, а также на всех стадиях костной и сухожильной формы заболевания показана операция.

В тяжелых стадиях применяют: антибактериальную терапию. При формировании гнойника применяют вскрытия панариция.

Вскрытие панариция дополняют дренированием так, чтобы обеспечить максимально

# Действия медсестры:

- обработать рану антисептиком
- наложить повязку с противовоспалительными мазями
- по назначению врача :антибиотики, обезболивающие