




Нозоды

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Нозодами называются препараты, приготовленные с соблюдением гомеопатической технологии из патологически измененных органов или частей органов животных и человека; из умерщвленных культур микроорганизмов, из продуктов распада органов животных и из жидкостей организма, содержащих возбудителей и продукты заболевания, которые после соответствующей обработки (контроль качества) более не являются вирулентными (токсичными). Таким образом, определение нозодов соответствует определению веществ согласно пп. 3 и 4 пар. 3 Закона о лекарственных препаратах от 24.08.1976 г.

- 
- Согласно данному закону, веществами являются:
 - 1). Химические элементы;
 - 2). Растения и части растений;
 - 3). Животные, в т.ч. живые, а также переработанные части тел, компоненты и продукты обмена веществ человека или животных;
 - 4). Микроорганизмы, в т.ч. вирусы, их компоненты и продукты обмена веществ.

- Приготовление нозодов регламентируется двумя предписаниями: НАВ-1 *Vorschrift 43* для препаратов (настоек) из патологически измененных органов или частей органов человека и животных и *Vorschrift 44* для препаратов (настоек) из умерщвленных культур микроорганизмов, из продуктов распада органов животных и из жидкостей организма, содержащих возбудителей или продукты заболевания.

- Перед изготовлением нозодов проводится стерилизация исходных веществ согласно Перечню гомеопатических лекарственных препаратов. После этого проводится проверка на стерильность согласно НДАВ 10 (1991). И лишь после этого начинается приготовление нозодов.
- Таким образом, нозоды являются не прививочными веществами или сыворотками, а обычными гомеопатическими препаратами.
- Различаются 4 группы нозодов (нозодных препаратов), которые приведены в нижеследующей таблице:

■ 4 ГРУППЫ НОЗОДОВ

■ Вирусные нозоды:

■ например, Herpes zoster-Nosode, Coxsackie-Virus-A9 и B4-Nosode.

■ 2. Бактериальные нозоды: например, Tuberculinum, Staphylococcinum (Staphylococcus), Streptococcinum (Streptococcus haemolyticus).

■ 3. Комплексные (сочетания): возбудитель + продукт реакции окружающей среды, например: Psorinum = чесоточный клещ + клещевой ход;

■ Medorrhinum = диплококк Нейссера + нагноения слизистой оболочки мочеиспускательного канала;

■ Luesinum = Spirochaeta pallida Schaudinn + гнойные выделения первичного сифилитического эффекта;

■ Bacillinum = туберкулезная + туберкул легких палочка Коха + туберкулезная мокрота.

■ 4. Патологически измененные органы и ткани, например, Granuloma dentis- Nosode, Otitis media-Nosode, Tonsillitis-Nosode, Struma cystica-Nosode, Ulcus ventriculi-Nosode, Dupuytren-Nosode, Osteomyelitis-Nosode, Polyarthriti- Nosode, Sinusitis-Nosode.

■ 4 принципа применения нозодов (согласно Алленди/Фортъе и Берновиль/Мартини).

- Применение согласно:
- 1. симптоматической схожести - на основе гомеопатического правила подобия;
- 2. анамнестико-этиологической схожести по отношению к старому не до конца излеченному заболеванию;
- 3. актуальной этиологической схожести - только в сочетании с дополнительными биологическими препаратами!
- 4. на конечной стадии или после перенесенного заболевания.
- Нозоды применяются согласно симптоматической схожести (на основе основополагающего гомеопатического принципа подобия) и анамнестико-этиологической схожести по отношению к ранее перенесенному, не до конца излеченному заболеванию. Например, *Diphtherinum-Nosode-Injeel (+forte)* не назначается при острой дифтерии (т.е. согласно актуальной схожести - см. п. 3), а применяется при сердечных заболеваниях, при которых наблюдаются те же симптомы, что и при осложнениях на сердце при дифтерии (т.е. согласно симптоматической схожести), а также при сердечных заболеваниях, в анамнезе которых присутствует дифтерия (т.е. согласно анамнестико-этиологической схожести).

- При применении нозодов согласно актуальной этиологической схожести необходимо учитывать, что нозоды как специфические лекарственные препараты могут назначаться согласно изотерапевтическому принципу, т.е. при тех заболеваниях, из продуктов которого они получены. Как правило, в подобных случаях нозоды являются промежуточными препаратами наряду с прочими показанными средствами.
- Нозоды являются хорошим средством для того, чтобы после перенесенного заболевания (быстро) вывести из мезенхимы депонированные токсины.
- Как правило, в данном случае речь идет не о токсинах-возбудителях заболевания, а об остатках возбудителя с латентными очагами болезни, а также о непатогенных колониях возбудителя. Особенно это относится к перенесенным инфекционным заболеваниям, например, кори, краснухе, ветрянке, гриппу, роже, скарлатине, тифу, дифтерии и т.п.

- Дозировка.
- Дозировка назначается строго индивидуально и зависит от диагноза пациента, его самочувствия и реакции на соответствующий нозод, которая может быть различной в различных обстоятельствах. Существуют следующие общие принципы дозировки:
 - 1. При применении нозода согласно симптоматической схожести - 2 раза в неделю по 1 инъекции.
 - 2. При применении нозода согласно анамнестико-этиологической схожести - 1 инъекция в неделю.
 - 3. При применении нозода согласно актуальной этиологической схожести - ежедневно или 3 раза в неделю по 1 инъекции для иницирующей терапии в сочетании с другими показанными препаратами.
 - 4. При применении нозодов в конце или после перенесенного заболевания (т.е. согласно "краткой анамнестико-этиологической схожести") - 2 раза в неделю по 1 инъекции в течение 2-4 недель.
- Длительность терапии нозодами также назначается строго индивидуально.

- При показаниях согласно актуальной этиологической схожести терапия длится, как правило, 8-10 суток; а при терапии согласно симптоматической схожести, например, при гриппе, в течение длительного времени (недели и даже месяцы) проводится по 2 инъекции в неделю, позже - по 1 инъекции в неделю соответствующих нозодов.
- При терапии согласно анамнестико-этиологической схожести после 2-3-недельной терапии интервалы между инъекциями могут быть увеличены с 1 недели до 2-3 недель. Рекомендуется начинать терапию с инъекций простой Injeel-формы соответствующих нозодов, после чего (особенно в случаях терапии согласно симптоматической и анамнестико-этиологической схожести) переходить на форму Injeel-forte, особенно если простая Injeel-форма не вызвала соответствующей реакции и выздоровления пациента.

- Единичные низкие потенции нозодов назначаются в тех случаях, когда терапия формой Injeel-forte не вызвала терапевтического эффекта.
- Например, Anthracinum в единичной потенции D10 на несколько ступеней ниже, чем Anthracinum-injeel forte, содержащий смесь потенций D15, D20, D30, D200. То же самое наблюдается и при сравнении Scarlatinum-injeel в единичной потенции D10 с Scarlatinum- Injeel forte (смесь потенций 15, D20, D30, D200). Bacterium coli в единичной потенции D5 на одну потенцию ниже, чем Bacterium coli-injeel forte; то же относится и ко всем остальным бактериальным нозодам, например, Bacterium lactis aerogenes, Bacterium proteus, Bacterium pyocyaneus, Brucella abortus Bang.

- Высокие потенции назначаются в тех случаях, когда инъекции простой Injeet-формы нозода вызывают чрезмерную реакцию организма пациента. Например, Variolinum в единичных потенциях D200 и D1000 и Vaccininum в единичной потенции D200 назначаются в тех случаях, когда Variolinum-injeel (D20, D30, D200) и Vaccininum-injeel (D20, 030, D200) вызывают чрезмерную реакцию. В качестве общего правила для терапии нозодами можно выделить следующие:


- 1. высокие потенции (D12, D30 и выше) назначаются при повышенной возбудимости (мышьячный, фосфорный, йодный и т.п. типы), при диатезах, при аллергиях, при хронических заболеваниях;
- 2. низкие потенции (D6, D8 и ниже) назначаются при более или менее острых заболеваниях, при низких реакционных типах организма (графитовый, кремниевый и т.п.), когда необходимо оказать органотропное воздействие на определенный орган, например, на миндалины с помощью Tonsillarproepfe-injeel forte или Tonsillitis-Nosode-injeel forte (D6, D10, D30, D200). Показания для высоких потенций также требуют значительных интервалов между инъекциями: несколько суток, иногда - недель. Показания для низких потенций требуют более коротких интервалов между инъекциями: как правило, 1-2 суток, возможно - несколько часов.

- Рекомендуется начинать терапию с внутримышечных, подкожных и внутрикожных (в невральные точки и точки акупунктуры) инъекций, а позже, при отсутствии реакции организма, переходить на внутривенные инъекции соответствующего нозода.
- Дозировка и потенции нозодов, используемых в педиатрии.
- Дозировка нозодов, используемых в педиатрии, принципиально не отличается от дозировки прочих гомеопатических препаратов, назначаемых детям. При этом дозы для детей несколько меньше, чем для взрослых.
- Дозировка для детей:
 - до 2 лет - 1/4 ампулы по 1,1 мл=0,25 мл;
 - от 2 до 6 лет - 1/2 ампулы по 1,1 мл=0,5 мл;
 - старше 6 лет - 1 ампула по 1,1 мл.

- Низкие потенции (D4-D8) назначаются в педиатрии при более или менее острых заболеваниях в начальных стадиях - как и при терапии взрослых пациентов.
- Высокие потенции (D12-D30 и выше) назначаются при терапии хронических заболеваний после предшествующего применения низких потенций. Потенции для детей назначаются те же, что и для взрослых.

- Принципиальные положения.
- Терапия нозодами как "средствами для очищения участка организма" может поддерживать практически любой вид терапии. Согласно учению Реккевега о гомотоксинах, нозоды назначаются для того, чтобы перевести заболевания из клеточных фаз в гуморальные, т.е. вызвать регрессивную викариацию. Нозоды также показаны при заболеваниях гуморальных фаз, когда существует опасность перехода заболевания в хроническое состояние, т.е. опасность прогрессивной викариации.

- Состав.
- Во всех случаях см. следующий пример.
- Adenoma mammae-injeel
- 1,1 мл раствора для инъекций содержит: Adenoma mammae D12, Adenoma mammae D30, Adenoma mammae D200 по 0,376 мл.
- Adenoma mammae-injeel forte
- 1,1 мл раствора для инъекций содержит: Adenoma mammae D8, Adenoma mammae D12, Adenoma mammae D30, Adenoma mammae D200 по 0,275 мл.
- Фасовка.
- Упаковки по 5, 10, 50, 100 и 500 ампул по 1,1 мл.

- 
- Перечень нозодов.
 - Подробности (например, показания) см. в алфавитном перечне препаратов в разделе "С. Гомеопатические единичные препараты в смеси потенций и в единичных потенциях".

- Adenoma mammae-injeel Д12, Д30, Д200
- Adenoma mammae-injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Причиняющие боль различной степени круглые, мелкоузловатые, плотные, доброкачественные узлы (узловидные образования) в молочных железах, симптом "дробинок" при мастопатии с типичным ухудшением состояния перед менструацией. См. также Mamma cystica-Nosode-Injeel, Mastopathia cystica-Nosode-injeel.

- Adenoma prostatae-injeel Д10, Д30, Д200
- Adenoma prostatae-injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Простатит, аденома простаты. Дизурия, странгурия, антигомтоксическая терапия при карциноме простаты.

- *Adeps suillus-injeel* Д12, Д30, Д200
- *Adeps suillus-injeel forte S* Д8, Д12, Д30, Д200
- Заболевания, обостряющиеся после приема в пищу животных жиров, особенно после потребления свиного сала. Холистеринемия. Гомотоксины, адсорбированные в соединительной ткани. Ожирение, *Akne vulgaris*. Себорея. Острая и хроническая экзема. Колики в области желчного пузыря. Блефарит. Ячмень. Халазион.
- Препарат показан при заболеваниях, возникающих в результате резкой потери веса, голодания, лечения обезвоживанием (т.е. при заболеваниях, причиной которых по существу является высвобождение гомотоксинов, поступающих при этом в кровь и лимфу).

- Anthracinum-injeel Д20, Д30, Д200
- Anthracinum-injeel forte Д15, Д20, Д30, Д200
- Anthracinum Д10 - индивидуальная потенция
- Образование нарывов на коже, сопровождающееся невыносимым интенсивным жжением, пузырьки от голубовато-фиолетового до черного цвета, выделяющие гнойную, с плохим запахом жидкость; относительная склонность к образованию гангренозных флегмон, септицемия, увеличение лимфатических узлов, септический паротит, гастроэнтерит, зловонная диарея, панариций, фурункулы, карбункулы, рожа, Akne vulgaris. Хорошо действует в сочетании с Pyrogenium-injeel.

- Appendicitis-Nosode-Injeel Д10, Д30, Д200
- Appendicitis-Nosode-Injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Хроническое увеличение лимфатических узлов, острый аппендицит.
Экспериментально: при хроническом запоре.

- Arthritis urica-Nosode-Injeel Д12, Д30, Д200
- Arthritis urica-Nosode-Injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Подагра. Суставные боли, в особенности ножные; уретический диатез. При заболеваниях разной остроты сочетать с Colchicum- Injeel (forte), Lithium chloratum-injeel (forte), а также с Lithiumeel (таблетки) и комплексными препаратами, содержащими Бензоат лития, такими, как Neuralgo-Rheum-Injeel (ампулы) и Rhododendroneel (капли).

- Ascariden-injeel Д12, Д30, Д200
- Ascariden-injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Глистные инвазии с соответствующими симптомами: анорексией, сменяющейся булимией; эозинофилией крови, кристаллами Шарко-Лейдена, как при бронхиальной астме; в мокроте - эозинофильные лейкоциты - явления, вызванные *Ascaris lumbricoides*. Токсическое действие из-за присутствия продуктов обмена глистов, возникновение нарушений деятельности желудочно-кишечного тракта, неврологические симптомы.

- Asthma-Nosode-Injeel Д10, Д30, Д200
- Asthma-Nosode-Injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Бронхиальная астма. Эмфизема. Хронический бронхит. Застойное легкое, силикоз, цианоз.
- Практически применяется и при коклюше, недержании мочи, спастических запорах, хронических экземах и различных фобиях, при агорафобии (у детей). Для регуляции детоксикации гистамина при заболеваниях в фазе импрегнации. При астме рекомендуется подкожно инъецировать в сочетании с необходимыми дополнительными препаратами (Tonico-injeel, Spascupreel, Drosera-Homaccord, Berberis-Homaccord, Acidum DL-malicum-Injeel, Acidum succinicum-injeel, Natrium pyruvicum-injeel, Mucosa compos., Coenzyme compositum Ampullen, Ubichinon compositum Ampullen, Hepar compositum. и др.).

- *Bacillinum-injeel* Д20, Д30, Д200
- *Bacillinum-injeel forte* Д15, Д20, Д30, Д200
- *Bacillinum* Д15 - индивидуальная потенция
- Склонность к заболеваниям простудного характера. Хронический бронхит, бронхиальная астма. Бронхоэктаз.
- Экзема, импетиго, *Petyriasis versicolor*, скрофулез, фурункулы на носу, Атрофический ринит. Тремор, особенно тремор рук. Глубоколежащие головные боли (голова как в тисках). Ухудшение после душевного напряжения. Улучшение при полном покое. Психосоматика: необоснованное чувство тревоги и страха (особенно у детей).

- Bacterium coli-injeel Д12, Д30, Д200
- Bacterium coli-injeel forte Д6, Д12, Д30, Д200
- Bacterium coli Д5 - индивидуальная потенция
- Утомляемость. Духовное и физическое истощение. Заговаривание. Потеря памяти на недавние события. Боязливость и нерешительность, часто связанные с метеоризмом. Озноб после приема пищи. Язык, обложенный желтовато-белым налетом, при этом на языке, посередине - красная полоса. При уринтенезмах и выделении мутной мочи с плохим запахом. Юлиан указывает на хорошее действие при сальпингите (предписывать также при аднексите), цистите, камнях в почках, холангите и депрессивном психозе. Особенно рекомендуется после терапии антибиотиками, в той или иной мере поражающей физиологическую Coli-флору.

- Bacterium lactis aerogenes-injeel Д12, Д30, Д200
- Bacterium lactis aerogenes-injeel forte Д6, Д12, Д30, Д200
- Bacterium lactis aerogenes Д5 - индивидуальная потенция
- После поражений флоры кишечника вследствие терапии антибиотиками и подобных поражениях. В качестве дополнительного средства при авитаминозе, панкреатите, нарушениях пищеварения в младенческом возрасте, при язве двенадцатиперстной кишки, отсутствии соляной кислоты в желудочном соке, диабете, а также при лимфатической конституции. Препарат особенно действен при К-типе по Курри.

- Bacterium proteus-injeel Д12, Д30, Д200
- Bacterium proteus-injeel forte Д6, Д12, Д30, Д200
- Bacterium proteus Д5 - индивидуальная потенция
- Гастроэнтерит, особенно диареи у младенцев. Цистопиелит, пупочный сепсис, отит, гангренозные процессы в легких, остеомиелит.
- После поражения флоры кишечника антибиотиками, химиотерапевтическими препаратами. Общее ослабление иммунитета. В терапевтической практике применяется при общей раздражительности, вызванной нервным расстройством (частые вспышки гнева, сопровождающиеся бросанием предметов; дети холерического темперамента стучат ногами). Периферические расстройства, например хромота перемежающаяся. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Гематемезис. Ангионевротический отек. Отрицательные изменения в характере детей. Головокружение. Герпес (Юлиан).

- Bacterium ruosyaneus-injeel Д12, Д30, Д200
- Bacterium ruosyaneus-injeel forte Д6, Д12, Д30, Д200
- Bacterium ruosyaneus Д5 - индивидуальная потенция
- Симптомы и осложнения после различных перенесенных заболеваний: воспалительные процессы в желчных и мочевых протоках, отит, гангрена кожи, заражение крови у рожениц. Гипергидроз. После злоупотребления средствами для очистки кишечника (сочетание с Senna-injeel forte) и при ангине.

- *Brucella Abortus Bang-injeel* Д10, Д30, Д200
- *Brucella Abortus Bang-injeel forte* Д6, Д10, Д30, Д200
- *Brucella Abortus Bang* Д5 - индивидуальная потенция
- Возбудитель лихорадки - *Febris undulans bovina* - с гриппозными, гастроэнтерическими, миалгическими и артрозными симптомами. Аборт. Дисменорея. Психозы, вызванные беременностью. Последствия вакцинаций различного рода.

- *Calculi bili-injeel* Д10, Д30, Д200
- *Calculi bili-injeel forte* Д6, Д10, Д30, Д200
- Желчнокаменная болезнь, холецистит, холангит; особенно эффективен этот препарат в сочетании с *Calculi renales-injeel*, *Bacterium coli-injeel*, *Vesica fellea suis-injeel*, а также в сочетании с *Injeel-Chol*, *Chelidonium-Homaccord*, *Hepeel*, *Hepar compositum*, *Mucosa compositum*, *Momordica compositum*, *Leptandra compositum*.

- *Calculi renales-injeel* Д10, Д30, Д200
- *Calculi renales-injeel forte* Д6, Д10, Д30, Д200
- Почечнокаменная болезнь, цистопиелит. Пиелонефрит. Заболевания простаты. Особенно эффективен препарат в сочетании с *Berberis-Homaccord*, *Calculi bili-injeel*, *Ureter suis-injeel*, а также в сочетании с *Reneel*, *Populus compos.*, *Mucosa compos.*, *Solidago compositum*.

- Carcinoma hepatis-injeel Д10, Д30, Д200
- Carcinoma hepatis-Injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Применяется в поддерживающей/дополняющей терапии при начальных стадиях рака печени, а также при метастазах в печени.

- Carcinoma hepatis metastatis-injeel Д10, Д30, Д200
- Carcinoma hepatis metastatis-injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- В поддерживающей / дополняющей терапии при неоперативной форме метастазов в печени. При нарушениях функции печени и преканцерозе печени, а также в качестве промежуточных ("на смену") инъекций при различных болезнях фаз импрегнации и дегенерации, а также в случаях начальной стадии рака с тенденцией к метастазированию.

- Carcinoma mammae-injeel Д10, Д30, Д200
- Carcinoma mammae-injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- В поддерживающей / дополняющей терапии при карциноме молочной железы (Mammae carcinom), особенно рекомендуется постоперативно и после облучения. Далее, при Mastopathia chronica cystica, Mastitis cystica, кистозной мастопатии, диффузном фиброматозе и др.

- Carcinoma uteri-injeel Д10, Д30, Д200
- Carcinoma uteri-injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- В поддерживающей / дополняющей терапии при карциноме матки, особенно при постоперативных состояниях, после облучения, радиотерапии и др.
- Так как миома матки редко перерождается в злокачественную опухоль, препарат применим и при миомах матки.

- Cerumen-injeel Д10, Д30, Д200
- Cerumen-injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Себорея, Akne vulgaris. Otitis externa, экзема ушного прохода. Как средство для перестройки организма, обладающее действием, сходным с действием Sulfur при отсутствии реакций на последние. Особенно эффективен препарат в сочетании с Adeps- suillus-injeel.

- Cholesterinum-injeel Д12, Д30, Д200
- Cholesterinum-injeel forte Д6, Д12, Д30, Д200
- Гепатопатии, сопровождающиеся увеличением печени. Для профилактики новообразования желчных камней. Экспериментально: при гиперхолестеринемии и при плевторе, особенно при *Plethora abdominalis*.

- Cirrhosis hepatis-Nosode-Injeel Д12, Д30, Д200
- Cirrhosis hepatis-Nosode-Injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Тяжелые нарушения функции печени, в особенности при тенденции / склонности к циррозу печени, с соответствующими симптомами: утомляемость, плохое самочувствие, непереносимость жирной пищи, вздутие кишечника, метеоризм, асцит, варикозное расширение вен пищевода, геморрой.

- Comedones-injeel Д10, Д30, Д200
- Comedones-injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Себорея, сопровождающаяся гиперкератозом фолликул волос с сильно увеличенным салоотделением.
Akne vulgaris et conglobata.

- Coxsackie-Virus-A9-Injeel Д15, Д30, Д200
- Coxsackie-Virus-A9-Injeel forte Д10, Д15, Д30, Д200
- Coxsackie-Virus-A9 Д6; Д7; Д8; Д12; Д20; Д30 - в форме индивидуальных потенций
- Coxsackie-Virus-B4-Injeel Д15, Д30, Д200
- Coxsackie-Virus-B4-Injeel forte Д10, Д15, Д30, Д200
- Coxsackie-Virus-B4 Д6; Д7; Д8; Д12; Д20; Д30 - в форме индивидуальных потенций
- Иммунологически подразделяющиеся типы А9 и В4 являются ответственными за целый ряд вирусных заболеваний. Существенным является тот факт, что эти вирусы могут быть как продромами (предшественниками), так и представителями вирусов гриппа и полиомиелита. При неясных и резистентных к терапии инфекциях следует всегда обращаться к рассмотрению этих вирусов в качестве возбудителей.
- Coxsackie-Virus-Ag-Injeel особенно рекомендуется использовать при желудочно-кишечных заболеваниях, таких, как гастрит, дуоденит, особенно Colitis mucosa et ulcerosa (оптимальны локальные инъекции в двенадцатую точку толстого кишечника, лежащую в носо-губной складке), Colon irretabile, хронически рецидивирующих желудочных инфекциях. Далее, при поражениях выводящих мочевых путей, таких, как цистопиелит, уретрит, острый (мочевой) пузырь, простатит, эпидидимит, полисинусит. Конъюнктивит, ларингит, полостно-бронхиальный синдром, бронхиальная астма. Coxsackie-Virus-B4-Injeel особенно рекомендуется при состояниях, вызванных последствиями "центральных" поражений, например при состояниях после менингита, соответственно Meningismus, после энцефалита и соответствующих ему психических симптомах, в том числе при депрессиях, бессоннице, головной боли и т.д.

- Crinis humanus-injeel Д10, Д30, Д200
- Crinis humanus-injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Алопеция (облысение). Преждевременное поседение (рекомендуется в сочетании с Onyx suis-injeel).

- Cystopyelonephritis-Nosode-Injeel Д12, Д30, Д200
- Cystopyelonephritis-Nosode-Injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Хронически рецидивирующие воспаления и осложнения после болезней в области мочевыводящих путей (включая почечную паренхиму).


- Diphtherinum-injeel Д18, Д30, Д200
- Diphtherinum-injeel forte Д10, Д18, Д30, Д200
- Осложнения после тяжелой формы дифтерии, особенно кардиологические (эндо- и миокардиты, ослабление (слабость) сердечной мышцы, колющие боли в области сердца, тахикардия, сменяющаяся брадикардией, экстрасистола, аритмия, гипотония) и неврологические (парезы, особенно в области небной занавески и мускулатуры глотки, а также периферических нервов с ослаблением / усилением рефлексов и расстройства чувствительности); паретичность. Далее, хронически рецидивирующие ангины (в сочетании с *Barium carbonicum-injeel* и *Splen suis-injeel* один раз в неделю, *Varijodeel*, *Dulcamara-Nomaccord*, *Psorinoheel* перорально).
- Плохой запах изо рта, отеки слизистых оболочек, например старческий бронхит, хронический блефарит. Заболевания, проходящие с секрецией сывороточного экссудата, такие, как плеврит, хронический нефрит, нефрит скарлатинозный отечный, острый полиартрит и хронический полиартрит с опуханием (деформацией) суставов.
- Diphtherinum-injeel компенсирует дефицит кортизона и функции коры надпочечников, а также ядер самих надпочечников при гиперсекреции адреналина вследствие стресса, перенапряжения, волнения и т.д.
- Утрата трудоспособности, в том числе и у молодых пациентов. Осложнения после вакцинации дифтерии.

- Diverticulose-Nosode-Injeel Д12, Д30, Д200
- Diverticulose-Nosode-Injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Симптомы диверкулёза в области пищеварительного тракта и мочевого пузыря, такие, как дисфагия, регургитация, симптоматика дивертикулеза пищевода, нерегулярность стула (чередование запора и поноса), колики. Далее, симптомы перитонита. Симптомы дивертикулы мочевого пузыря, такие, как странгурия: бактериальные инфекционные заболевания с неопределенным возбудителем уреа-области, сопровождающиеся температурой и ознобом.

- Duodenitis-Nosode-Injeel Д10, Д30, Д200
- Duodenitis-Nosode-Injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Язва двенадцатиперстной кишки, хронический дуоденит при булимии и "голодных болях", а также в качестве "промежуточного" (на смену) средства при панкреатите.

- Dupuytren-Nosode-Injeel Д12, Д30, Д200
- Dupuytren-Nosode-Injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Уплотнение и сморщивание при ладонном апоневрозе с образованием плотных тяжей и узелков. Дозировка: еженедельно одна ампула инфильтруется в область уплотненного, сморщенного сухожилия соответствующего пальцевого сгибателя. Дополнительно длительная терапия Graphites-Homaccord (два раза в день по 8-10 капель) и на смену Arnica-Heel (два раза в день по 8-10 капель).
Вследствие каузальных и генетических взаимосвязей возможно экспериментальное применение при Induratio Penis Plastica.

- Dystrophia musculorum progressiva-Nosode-Injeel Д12, Д30, Д200
- Dystrophia musculorum progressiva-Nosode-Injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Хронические дегенеративные заболевания поперечнополосатой мускулатуры, независимо от вида и локализации (атрофия, псевдогипертрофия: патологическое увеличение соединительной ткани и жировой ткани внутри анатомически измененной, с нарушением функционирования мускулатуры).

- 
- Echinococcinum-injeel Д12, Д30, Д200
 - Echinococcinum-injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
 - Осложнения с более или менее токсическими проявлениями, после поражения собачьими ленточными глистами и после оперативного удаления цист эхинококка.

- Febris wolhynica-Nosode-Injeel Д12, Д30, Д200
- Febris wolhynica-Nosode-Injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Применение согласно правилу анамнестическо-этиологической схожести (тяжелая "траншейная лихорадка"), т.е. симптоматической схожести, например: чувство разбитости, головная боль, боли в большеберцовой кости (при этом применяется также *Kalmia compositum*), боли в конечностях, в особенности неопределенной природы, прежде всего ночные мышечные боли, а также боли в мягких тканях, костные боли, боли в связках, сухожилиях и местах прикрепления мышц.

- Fel suis-injeel Д10, Д30, Д200
- Fel suis-injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Нарушения функционирования печени: экскреторной функции, функции детоксикации и др. Дисбактериоз кишечника. Тахикардия и Arrythmia cordis.

- Fel tauri-injeel Д10, Д30, Д200
- Fel tauri-injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Fel tauri Д5 - в форме индивидуальной потенции
- Холангит, холецистит, холелитиаз. Нарушения функции детоксикации печени. Дополнительное средство при язве желудка и язве двенадцатиперстной кишки. Общее средство для детоксикации любого вида токсинов.

- Fluor albus-Nosode-Injeel Д12, Д30, Д200
- Fluor albus-Nosode-Injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Бели. Fluor albus (особенно дисфункциональные).
Дополнительная терапия при
Trichomonadae-Fluor, Soor-Fluor, Ои
воспалительных процессах в женских половых
органах, таких, как вагинит (кольпит), воспаление
шейки матки, эндометрит.

- Gastritis-Nosode-Injeel Д10, Д30, Д200
- Gastritis-Nosode-Injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Хронический и хронически рецидивирующий катар слизистой оболочки желудка, в особенности гастрит с повышенной и пониженной кислотностью желудочного сока, без / с эрозиями или изъязвлениями (Gastritis erosiva, Ulcus ventriculi). Преканцероз желудка.

- Glioma-injeel Д12, Д30, Д200
- Glioma-injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- (Состояние после) заболеваний в области нейроглии головного и спинного мозга, например глиобластома, глиоз, глиоматоз, глиофиброма. Кроме того, при истинной невриоме, нейрофиброматозе.


- Granuloma dentis-injeel Д10, Д30, Д200
- Granuloma dentis-injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Для поддерживающей терапии при заболеваниях, вызванных очаговой инфекцией и возникших вследствие этих заболеваний токсикозов, при "предположительном очаге инфекции". Заболевания с очаговым генезисом, например анамнезы ревматического круга форм, хронические невралгии и невриты, головные боли, эндо-, мио-, перикардиты с / без нарушений сердечного ритма, отсутствие (повреждение) сердечного клапана. Далее, при абсцессе в области альвеолярного отростка и пародонтопатиях.

- Grippe-Nosode-Injeel Д10, Д30, Д200
- Grippe-Nosode-Injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Один из наиболее часто употребляемых нозодных препаратов, так как осложнения после гриппа встречаются очень часто, например хронический полисинусит, астматоидные заболевания, длительная (затяжная) хрипота, ревматические заболевания с более или менее частыми болями (гриппозный ревматизм), истощение и утомляемость, заболевания сердца, нарушения кровообращения, чувство разбитости в конечностях, часто связанное с мышечными болями, головные боли, озноб, а также ночное потение и др.
- Далее, общая склонность к тучности, ожирению (в том числе у детей), вызванная пониженной функцией щитовидной железы. Склонность к хронически рецидивирующим простудам. Профилактически: с целью активной иммунизации.

- Hepatitis-Nosode-Injeel Д20, Д30, Д200
- Hepatitis-Nosode-Injeel forte Д15, Д20, Д30, Д200
- Рецидивирующие гепатиты и хронически персистирующие гепатиты любого вида и происхождения, в том числе вызванные невыделенным возбудителем, например Morbus Воеск, Morbus Hodgkin; миелоидная лейкемия. Общетерапевтическое средство при нарушениях функции печени с более или менее сильными патологическими отклонениями от нормальных значений (после проведения клинических исследований).

- Herpes simplex-Nosode -Injeel Д12, Д30, Д200
- Herpes simplex-Nosode-Injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Хронически рецидивирующий герпес любого генезиса и любой локализации; при герпесовидных кожных заболеваниях, при заболеваниях герпесовидного типа, вызванных лекарственными средствами, и при инфекционных заболеваниях, которые могут сопровождаться Herpes labialis.

- Herpes zoster-Nosode-Injeel Д12, Д30, Д200
- Herpes zoster-Nosode-Injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- При ранней стадии заболевания Herpes zoster следует применять простую форму Injeel, тогда как на стадии образования герпесных бляшек, то есть на 10-й-14-й день после начала болезни, следует применять форму Herpes zoster-Nosode-Injeel forte, а впоследствии снова перейти к 30-й форме Herpes zoster-Nosode-Injeel. Кроме того, при постгерпетических невралгиях, а также при заболеваниях, аналогичных опоясывающему лишаю.

- 
- *Hirudo medicinalis*-injeel Д10, Д30, Д200
 - *Hirudo medicinalis*-injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
 - *Purpura haemorrhagica*, петехии, кровоподтеки, склонность к кровоизлияниям.

- Kieferostitis-Nosode-Injeel Д12, Д30, Д200
- Kieferostitis-Nosode-Injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Фокальные заболевания и фокальные токсикации, причем внимание следует обратить на то, что, несмотря на удаление очага, часто не наступает никакого улучшения.

- Klebsiella pneumoniae-injeel Д12, Д30, Д200
- Klebsiella pneumoniae-injeel forte Д6, Д12, Д30, Д200
- Для поддерживающей терапии при / после пневмонии Фридлендера; при силикозе, пневмокониозе, бронхоэктазе, Asthma bronchiale, а также в качестве дополняющего средства при остром гриппе, плеврите и пневмонии (особенно у страдающих ожирением пациентов). Последствия терапии антибиотиками.

- Lac caninum-injeel Д12, Д30, Д200
- Lac caninum-injeel forte Д6, Д12, Д30, Д200
- Ежедневная смена симптомов, что характерно как при головной боли/мигрени, так и при ангине. Насморк с поочередно заложенными ноздрями. Далее, ревматические "странствующие" боли в конечностях, мышцах, суставах, а также нервные боли. Мастопатия с выраженной (пре-)менструальной мастодинией. Слишком частые или слишком сильные менструации. Недостаток молока у кормящих. Галакторея при отсутствии вскармливания. Осложнения после дифтерии. Гастрит с нервными нарушениями аппетита; запор с тщетными позывами; нарушения пищеварения при аллергии на молоко. Язык с белым налетом и красными краями.
- Ухудшение от холода (общая знобкость), по утрам, во время менструаций. Улучшение при сгибании и разгибании (спинные и поясничные боли, боли в животе, боли в указательном пальце).

- Lac defloratum-injeel Д10, Д30, Д200
- Lac defloratum-injeel forte Д6, Д12, Д30, Д200
- Как при Lac caninum - дефиците молока у рожениц, так и при слишком большом выделении молока после конца кормления (галакторея). Отвращение к молоку и непереносимость молока. Головные боли, утром ото лба к затылку, при этом нарушения зрения, тошнота, рвота (особенно во время менструаций). Понос, перемежающийся очень твердым стулом, иногда в связи с анальным свищом. Боли в молочных железах во время месячных, аналогичные мастопатии и мастодинии. Этот препарат лучше всего использовать, если заболевание связано с токсоплазмозом.

- Leptospirose-Nosode-Injeel Д12, Д30, Д200
- Leptospirose-Nosode-Injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Если в анализе был лептоспироз (лептоспирозы относятся к заболеваниям, передаваемым от животных людям, = зоонозам).


- Listeriose-Nosode-Injeel Д12, Д30, Д200
- Listeriose-Nosode-Injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Листерииоз является зоонозом, причем возбудители заболевания передаются от животного-хозяина (свиньи, коровы, овцы, козы, куры, грызуны) при контакте с молоком, через грязь на руках.
- Этот препарат может применяться при всех известных зоонозах, а также в тех случаях, когда из анамнеза видно, что инфекция исходит от животного. Состояния после перенесенной листериоз-фетопатии, в частности нарушения умственного развития.

- Luesinum-injeel Д15, Д30, Д200
- Luesinum-injeel forte Д10, Д15, Д30, Д200, Д1000
- По Юлиану, это эффективное средство, особенно при лечении детей (отставание в школе, трудный характер), а также при их неспособности усвоить арифметические действия. Показания: забывчивость, беспокойство, боязливость и депрессия. Неукротимый понос, невыполнение при этом требования вымыть руки. Стреляющие боли, усиливающиеся по ночам, колющие боли в период бодрствования (днем). Боли в затылке. Хронический конъюнктивит. Боль в глазах и бессонница в период от полуночи до шести часов утра. Птозис с сонным выражением лица. Невралгии (лицевые) и парезы. Гнойная оторрея. Прогрессирующая глухота. Озена. Образование нарывов на голосовых связках. Потеря голоса накануне месячных. Хроническая астма при теплой влажной погоде.

- Стреляющие боли в сердце. Ощущение кипящей жидкости, текущей по артериям (Юлиан).
- Слюноотделение. Гастрит с пониженной кислотностью желудочного сока. "Израженный" пищевод. Вздутие кишечника. Анальный свищ. Геморрой с кровотечениями. Недержание мочи. Импотенция. Бели. Дисменорея. Зуд вульвы. Различные костные заболевания, например позвоночника, костная киста, остеохондроз. Болезнь Шойерманна. Облысение. Lichen ruber planus. Пятна на коже медного цвета. Витилиго. Ломкость костей (продольные трещины). Ухудшение при ярко выраженных холоде и жаре, при влажном ветре (ночью и в часы утренних и вечерних сумерек). При этом страх перед ночью из-за физической и духовной опустошенности при пробуждении. Улучшение после привычных движений. Кроме того, при пристрастиях, особенно к алкоголю; при неустойчивом характере, психозе, злобности и коротких вспышках гнева, меланхолии, ощущении безнадежности, склонности к суициду, мурашках, суетливости, ночном беспокойстве и страхе.
- Сомнения в выздоровлении, испуг, подавленность, безразличие к окружающим, безрадостность, немотивированные смех и слезы.

- Lyssinum-injeel Д15, Д30, Д200
- Lyssinum-injeel forte Д12, Д15, Д30, Д200
- Все симптомы обостряются при виде или звуке текущей воды, ярком свете (например, при езде в автомобиле против солнечного света), ярком солнечном свете, при езде в вагоне, при нагибании (Юлиан), особенно при взгляде на лестницу, дальнейшее ухудшение всех симптомов при совершении привычного движения или при возбуждении (волнении), т.е. ухудшение всех симптомов от малейшего шороха и сквозняка.
- Чувство "удавки" на шее (ангина), далее, спазм глотки, дисфагия, в частности при глотании жидкостей. Головные боли, лающий кашель, Ночной энурез состояния, описываемые как аналогичные эпилептическим, двигательный паралич, конвульсии у беременных, люмбаго, коксартрозные симптомы. Беспокойство, торопливая речь, сексуальное перевозбуждение. Особенно благоприятное воздействие оказывает препарат в сочетании Nurophysis suis-injeel.

- Malaria-Nosode-Injeel Д12, Д30, Д200
- Malaria-Nosode-Injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Лечение после перенесенной малярии, осложнений, возникших в результате этого заболевания, в частности при неполном выздоровлении с хроническим течением заболевания. Анемия, кахексия, увеличение печени и селезенки. Переутомление, состояния слабости и истощения, анорексия.

- 
- Mamma cystica-Nosode-Injeel Д10, Д30, Д200
 - Mamma cystica-Nosode-Injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
 - У женщин: доброкачественные узелки в молочной железе, в частности мастодиния кистозного вида. Гинекомастия. У мужчин: юношеская макромастия.

- Mastoiditis-Nosode-Injeel Д10, Д30, Д200
- Mastoiditis-Nosode-Injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Хронический Otitis media, склонность к рецидивирующему воспалению среднего уха, глухота среднего уха, ретоксические поражения слухового аппарата. Хронические лихорадочные состояния. Хронические невралгии (при невралгиях тройничного нерва этот препарат следует применять вместе с Granuloma dentis-injeel, в остальных случаях - в сочетании с Gelsemium- Homaccord, Spigelon). Экспериментально: при хроническом остеомиелите, остеопорозе, при фокальных очагах инфекций.
- Mastopathia cystica-Nosode-Injeel Д12, Д30, Д200
- Mastopathia cystica-Nosode-Injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Показания такие же, как и для Mamma cystica-Nosode-Injeel, особенно в тех случаях, когда в комплексе симптомов преобладают боли.
- рода переломов. При хронических костных заболеваниях, таких, как остеомаляция, рахит. При Otitis media chronica (в этом случае применять в сочетании с Otitis media-injeel и, при необходимости, в сочетании с Mastoiditis-Nosode-Injeel).

- Osteomyelosklerose-Nosode-Injeel Д12, Д30, Д200
- Osteomyelosklerose-Nosode-Injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- При комплексе симптомов "остеосклеротическая анемия": миелосклероз, остеосклероз, остеомиелосклероз, остеомиелофиброз, остеомиелоретикулез. При ломкости костей, возникшей вследствие недостаточной эластичности костной ткани. При апластических анемиях (мраморная болезнь; остеосклероз), сопровождающихся спленогепатомегалией. При любого рода остеомиелосклерозах и миелосклерозах после инфекционного заболевания и вследствие воздействия токсических факторов (бензола, свинца, фосфора, фтора, стронция, анилинового красителя).

- Otitis media-Nosode-Injeel Д10, Д30, Д200
- Otitis media-Nosode-Injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Хронический и хронически рецидивирующий Otitis media. Хроническая течь из уха, холестеатома, Otitis externa. Синусит. Катар евстахиевой трубы. Иногда эффективен при хроническом цистите, склонности к нему (вследствие того, что между ухом и мочевым пузырем существует определенная взаимосвязь). Препарат применяется также в качестве сменного средства при остеомиелите и при воспалительных процессах (нагноениях) иного вида и локализации.

- Medorrhinum-injeel Д12, Д30, Д200
- Medorrhinum-injeel forte Д10, Д12, Д30, Д200
- Неупорядоченный образ жизни пациента; беспокойство и состояние тревоги; эксцессивная нервозность и состояние истощения. Чувствительность к сквознякам. Пессимистическое состояние. Депрессивное состояние психики. Проявления упрямства и других негативных черт характера. Пристрастия. Фронтальная головная боль с ощущением стягивания. Бессонница в пред- и послеполуночные часы. Иногда - недержание мочи в ночные часы. Забывчивость, превышающая нормальную (последних событий); пациент теряет нить беседы.

- Ринит и синусит, сопровождающиеся "заложенным" носом, anosmia. Болезненный, сухой кашель, усиливающийся в ночное время. Глоточный спазм и астма, улучшение при этом наступает на морском побережье. Потребность в острых блюдах и сладостях, а также в мороженом, пиве и соленых блюдах. Спастические боли в желудке. Запоры и твердый стул. Почечные колики; цистит и уретрит. Бели; зуд гениталий. Грудь женщины холодная как лед, "мраморные" - нечувствительные к прикосновению. Ревматические симптомы (монартрит), гонит, коксартроз. Все виды различных деформаций суставов пальцев, руки. Ощущение "пламени", жара и боли в руках и на подошвах ног; ощущение покалывания. Внезапно начинающиеся и прекращающиеся невралгические боли.


- Влажная, блестящая, как бы "маслянистая" кожа; выделение пота с дурным запахом; бородавки; острые и широкие кондиломы; хронические экземы и дерматозы. Гидрогеноидные и сикозные состояния. Заболевания вследствие вакцинаций. Экзема у детей грудного возраста, локализованная на месте сидения, "ночная" астма у детей, Cholera infantum, выпадение прямой кишки у детей, анемия, худоба, отставание в развитии у детей. Ухудшение утром и в дневные часы: с восхода до захода солнца.

- Meningeoma-injeel Д12, Д30, Д200
- Meningeoma-injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Послеоперационные осложнения после удаления менингеомы, симптоматически - при сдавливании спинного мозга, нарушениях вестибулярного аппарата, головокружении, мигрени, нарушениях обоняния, застойном соске (зрительного нерва), пучеглазии и других симптомах давления на мозг; далее, при менингизме и менингеальных реакциях.


- Morbillinum-injeel Д12, Д30, Д200
- Morbillinum-injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Лечение осложнений после перенесенной кори, например нарушений кровообращения, общих гиперэргических и гипоэргических реакциях с повышенной склонностью ко многим заболеваниям. Экзантемы, схожие с корью. Катаральные проявления, такие, как риниты, фарингиты, бронхиты, конъюнктивиты со светобоязнью и отеком лица, ларингиты и Другие катаровидные проявления, обусловленные вирусной инфекцией.

- MS-Nosode-Injeel Д12, Д30, Д200
- MS-Nosode-Injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Рассеянный склероз и сходные с ним анамнезы, например энцефаломиелит, а также пара- и постинфекционные миелиты в течение инфекционных заболеваний, таких, как корь, краснуха, пневмония, тиф, малярия и др.
- Нистагм, "скандирующая" речь, интенционный тремор, Neuritis retrobulbaris (нарушение зрения, выражающееся в "эффекте вуали", падение остроты зрения), мозжечковая атаксия, спастические парезы при отсутствующем рефлексе передней брюшной стенки. Нарушения чувствительности, ощущение глухоты и напряжения, нарушения вестибулярного аппарата, головокружение, нарушения в области мочевого пузыря и кишечника. Состояния эйфории, немотивированный смех, депрессии, нарушения умственных способностей.

- Mumps-Nosode-Injeel Д12, Д30, Д200
- Mumps-Nosode-Injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Свинка, орхит, панкреопатия, панкреатит, миокардит, ревматические и полиневротические симптомы, а именно в тех случаях, когда заболевание находится в ранней стадии (ранняя тяжелая свинка), или же препарат Mumps-Nosode-Injeel and forte следует применять согласно правилам симптоматической схожести.

- 
- Myoma uteri-injeel Д10, Д30, Д200
 - Myoma uteri-injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
 - Миома матки, миоматоз, меноррагии, метроррагии, фригидность. Стерильность у молодых женщин.

- Nagelmykose-Nosode-Injeel Д10, Д30, Д200
- Nagelmykose-Nosode-Injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Картины заболеваний, симптоматически связанных с кожными проявлениями, а также собственно заболевания кожного покрова. Микоз ногтей и дерматомикоз. Выпадение волос. Применять также при заболеваниях, которые возникли вследствие ретоксического поражения после наружной и внутренней терапии микозов, например хронические невралгии. В данном случае анамнез является решающим фактором.

- 
- Nageltrichophytie-Nosode-Injeel Д10, Д30, Д200
 - Nageltrichophytie-Nosode-Injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
 - Показания такие же, как и для Nagelmykose-Nosode-Injeel.

- Neurofibroma-injeel Д12, Д30, Д200
- Neurofibroma-injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Соединительно тканые, мягкие доброкачественные опухоли; в основном встречаются в области периферийных нервов, иногда - в легких, в средостении, в области спинного мозга, костной ткани; сопровождаются соответствующими симптомами: зуд, парестезия, боли.

- Osteomyelitis-Nosode-Injeel Д10, Д30, Д200
- Osteomyelitis-Nosode-Injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Применяется в поддерживающей терапии при хронических нагноениях в области костного мозга – с / без свищей - вне зависимости от локализации, происхождения, вида возбудителя. После различного

- Ovarialcyste-injeel Д10, Д30, Д200
- Ovarialcyste-injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Кистозные изменения самого различного вида и локализации возможно, в частности, экспериментальное применение при кисте яичника, особенно после перенесенной на яичниках операции с целью избежать рецидива.
- Жалобы при первой менструации, Klimakterium praesox, "гинекологической мигрени", например перед или во время менструаций.

- Ovum-injeel Д10, Д30, Д200
- Ovum-injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Аллергии, возникающая при употреблении в пищу яиц, а также при крапивнице и других аллергических заболеваниях. При хронических экземах с / без прурита. При аллерго-эпигастральном синдроме, сопровождающемся болями в надчревной области, при болях в сердце (по Ремхельду), икоте; запоре, сменяющемся диареею; состояниях мигрени.

- Охурен-injeel Д12, Д30, Д200
- Охурен-injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Заражение острицей с соответствующими симптомами, такими, как точечный зуд в анальном отверстии, экзема анального отверстия, позыв к дефекации, проктит, иногда энурез, вульвит; нервные расстройства, возникающие как следствие заболевания.

- Ozaena-Nosode-Injeel Д10, Д30, Д200
- Ozaena-Nosode-Injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Хронический ринит, с / без синусита, в частности атрофический ринит, сопровождающийся - образованием корочек, их бактериальным разрушением; неприятный запах.

- Paratyphoidinum B-injeel and forte см.
Salmonella paratyphi B-injeel
- Paradontose-Nosode-Injeel Д12, Д30, Д200
- Paradontose-Nosode-Injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- В качестве дополняющего средства при любого вида паратодонтопатиях. Кровоточивость десен. Атрофия десен. Фокальные очаги, расположенные в деснах.

- Periproktitischer Abszess-Nosode-Injeel Д12, Д30, Д200
- Periproktitischer Abszess-Nosode-Injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Хронически-рецидивирующие воспаления (перипроктит, парапроктит) с или без образования парапроктального абсцесса соединительной / паренхиматозной ткани вокруг прямой кишки, в частности после хирургического вмешательства - во избежание рецидива.

- Pertussis-Nosode-Injeel Д10, Д30, Д200
- Pertussis-Nosode-Injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- При коклюше (наряду с Drosera-Homaccord, Spascupreel, Droperteel). Далее, при "глубоких" формах кашля, например при эмфиземе легкого и бронхиальной астме - особенно в том случае, если секрет (слизь) вязкий и клейкий, иногда при этом наблюдается также рвота и ларингоспазм; при бронхоэктазах. Согласно Юлиану этот препарат применяется также при неврологических (детских) заболеваниях, сопровождающихся конвульсиями. Далее (согласно тому же источнику), при тетании, эпилептоидных состояниях, энцефалопатиях с более или менее выраженным слабоумием и особенно тогда, когда в анамнезе указывается на присутствие коклюшного кашля.

- Poliomyelitis-Nosode-Injeel Д20, Д30, Д200, Д400
- Poliomyelitis-Nosode-Injeel forte Д15, Д20, Д30, Д200, Д400
- Парезы любого вида, особенно вялые. Лихорадка, сопровождающаяся болью в конечностях и головной болью. Экспериментально: при спинальной мышечной атрофии, амиотрофном латеральном склерозе, рассеянном склерозе, атрофических параличах, трофических и вазомоторных нарушениях, "болтающихся" суставах, деформациях скелетообразующих костей и деформациях суставов.

- Polyarthritits-Nosode-Injeel Д12, Д30, Д200
- Polyarthritits-Nosode-Injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- "Ревматоидные" воспаления суставов, в частности, экссудативного и фиброзного характера (сморщивание суставной сумки).
Полиартроз суставов пальцев и сустава основания большого пальца, с артрозным образованием вокруг него. Ригидность суставов в утренние часы.

- Polypus laryngis-injeel Д10, Д30, Д200
- Polypus laryngis-injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Полипы в гортани. Острый и хронический ларингит, острая и хроническая хрипота (у дикторов, певцов и людей Других "голосовых" профессий). Различные полипы слизистой оболочки иной локализации, например полипы носовые, прямой кишки, мочевого пузыря (при необходимости можно применять смесь соответствующих нозодов или использовать их попеременно).

- Polypus nasalis-injeel Д10, Д30, Д200
- Polypus nasalis-injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Носовые полипы и полипы слизистой оболочки придаточных пазух носа, лимфатизм, аденоидные отростки, гипертрофия миндалин (особенно носоглоточных). Вследствие хронической гипертрофии миндалин (в особенности *Tonsilla pharyngica*) очень затрудняется носовое дыхание (открытый рот), что приводит к значительным затруднениям развития у детей.

- Polypus recti-injeel Д12, Д30, Д200
- Polypus recti-injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Полипы в области прямой кишки (безусловно, исключая Rectum- carzinom).
- Polypus vesicae urinarae-injeel Д12, Д30, Д200
- Polypus vesicae urinarae-injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Экспериментально: при опухолях мочевого пузыря (эпителиоме, папилломе и относительно редко встречающихся полипах мочевого пузыря), в частности после удаления опухолей - во избежание рецидива.

- Psoriasis-Nosode-Injeel Д10, Д30, Д200
- Psoriasis-Nosode-Injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Средство "на смену" при различного рода кожных заболеваниях хронического воспалительного типа и дегенеративного типа, например при псориазе, хронической (острой) экземе, дерматомикозах, нейродермите, склеродермии, волчанке, аналогичных псориазу комплексах симптомов, таких, например, как при Parapsoriasis lichenoides и Pityriasis rubra pilaris. Psoriasis-Nosode-Injeel следует применять при различных заболеваниях, относящихся к неупомянутым выше видам заболеваний, в том случае, если в анамнезе упомянут чешуйчатый лишай (псориаз) и его ретоксическая терапия, а также в случае отсылки в анамнезе к другим кожным заболеваниям.

- Psorinum-Injeel Д12, Д30, Д200
- Psorinum-injeel forte Д9, Д12, Д30, Д200
- Согласно Юлиану Psorinum находится между Sulfur и Thuja и дополняет Tuberculinum. Этот тип очень схож в своей симптоматике с Sulfur-injeel (отталкивающий неопрятный внешний вид, плохой запах). В противоположность Sulfur-пациентам, у которых ярко выражена чувствительность к холоду и зябкость, у Psorinum-пациентов тепло ухудшает состояние (например, при чесотке).

- Характерно: пониженная реакционная способность со снижением обменной функции и функции печени, замедленная реконвалесценция со склонностью к возникновению хронического состояния. Хронические дискразические состояния при далеко зашедшей конституциональной абсорбции токсинов. Хронические экземы и высыпания на коже; такие поражения кожи, как импетиго, псориаз, себорея, прыщи, фурункулы, зуд "cum et sine materia".

- При этом кожные заболевания часто сменяются астмой. Блефарит, конъюнктивит со слезоотделением, жжение в глазах, фотофобия, фотопсия. Разрастание аденоидов, хронический насморк, сенная лихорадка. Бронхиальная астма, хронический бронхит, бронхоэктазы. Ушная экзема, хронический Otitis externa et media с хронической вонючей отореей. Stomatitis aphthosa, пародонтоз, фарингит. Булимия, улучшение после принятия пищи, при этом отвращение к мясу свиньи. Диареи, часто сменяемые атоническими запорами. Гипотония, сопровождающаяся слабостью и "цианозным" лицом, иррегулярный пульс.

- Недержание мочи по ночам, хронический уретрит, остаточная моча при заболеваниях простаты. Метрит, потеря либидо и потеря потенции.
- Хронические ревматические заболевания с небольшим "подгибанием" в суставах, растяжения и привычные вывихи. Мигрени и другие головные боли, часто связанные с булимией. "Жесткие" невралгии.
- Состояния безнадежности, меланхолии, печали; состояние мизантропии, сопровождающейся комплексом неполноценности, нарушения памяти, иногда кататонические и шизоидные состояния. Дрожание рук. Состояния страха и беспокойства, мысли о смерти, причем суицидального (иногда) характера.

- Pyodermie-Nosode-Injeel Д10, Д30, Д200
- Pyodermie-Nosode-Injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Неострые и хронические кожные заболевания, мокнущие экземы, фурункул, фурункулез, карбункул (в частности, при выраженной склонности к рецидивам).
- Заболевания, встречающиеся после ретоксической терапии кожного заболевания, например бронхиальная астма, невралгии, поражения печени. Часто области применения этого препарата совпадают с областями применения таких препаратов, как Psoriasis-Nosode-Injeel, Psorinum-injeel и Anthracinum Injeel. Особенно эффективен в сочетании с Asthma-Noso-de-Injeel.

- Pyrogenium-injeel Д12, Д30, Д200
- Pyrogenium-injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Pyrogenium Д5; Д6 - в форме индивидуальной потенции

- Сильные, преобладающие реакционные фазы (заболевания реакционных фаз) со склонностью к нагноениям, лимфангиту, гангренозным состояниям и септическому развитию, в частности тогда, когда эти фазы (заболевания этих фаз) связаны со следующими симптомами: озноб и зябкость, озноб при повышении температуры, при высокой температуре и в процессе потоотделения.

- Особенно эффективен при начинающейся лихорадке, которая всегда сопровождается зябкостью и иногда холодным потом. Расхождение между пульсом и температурой: либо необычно частый для данной температуры пульс, либо редкий пульс при повышенной температуре. Неприятный запах всех выделений: например, запах стула близок к запаху падали. Чувство израненности во всем теле, ощущение боли, достигающее до ощущения "слишком жесткой постели". Болезненное состояние, начинающееся с болей в конечностях. Беспокойство с ярко выраженным стремлением двигаться. Потребность в тепле. Улучшение при согревании. Ухудшение при движениях и беспокойстве.

- Язык темно-красный, гладкий (лаковый язык). Болтливость и чрезмерная раздражительность. Грипп, протекающий с высокой температурой и желудочно-кишечными осложнениями и сопровождающийся глоточной флегмоной, пневмонией со склонностью к абсцессу легкого и гангрене легкого, а также перечисленные заболевания, проявляющиеся вне зависимости от заболевания гриппом. Cholera infantum. Холецистит; поддиафрагмальный и перинефритический абсцесс; нефрит с выделением белка во время септического процесса. Мастит. Эндометрит. Родильная лихорадка. Пролежень, панариций. Инфицированные раны со склонностью к септическому состоянию.

- Serum ovile-injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Serum ovile Д6; Д200 - в форме индивидуальной потенции
- Средство "на смену" при анафилаксии, при различных видах аллергии, например при сенной лихорадке, сенной астме, бронхиальной астме иного аллергического происхождения, при нейродермитах, при острых и хронических экземах. При Хашимото-тиреоидите, струмите.

- Sinusitis-Nosode-Injeel Д10, Д30, Д200
- Sinusitis-Nosode-Injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Острые, хронические и особенно хронически рецидивирующие воспалительные процессы, нагноения в области дополнительных носовых пазух, аденоидные отростки, лимфатизм, сенная лихорадка и другие аллергические и вазомоторные риниты и синуситы, синус-бронхиальный синдром. Препарат применяется также для поддерживающей терапии хронических ринитов со склонностью к озене (в сочетании с Ozaena-Nosode-Injeel); далее: при заболеваниях, которые могут быть рефлекторно взаимосвязаны со слизистой оболочкой носа, например при рефлекс-астме, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, невралгиях и т.д. Применять следует преимущественно в сочетании с Euphorbium compositum (ампулы, капли, спрей для носа), возможно также в сочетании с Mucosa nasalis suis-injeel или Mucosa compositum в ярко выраженных хронических случаях и при склонности к озене. При аденоидах и носовых полипах - в сочетании с Psorinoheel и Graphites Homaccord, при поражениях желудочно-кишечного тракта - в сочетании с Ventriculus suis-injeel и / или Duodenum suis-injeel.

- Rubeolae-Nosode-Injeel Д12, Д30, Д200
- Rubeolae-Nosode-Injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Лечение после перенесенной краснухи. Энцефаломиелитические и ревматоидные симптомы, возникающие на ранних стадиях заболевания (краснухи). Опухание лимфатических узлов, особенно цервикальных, аксиллярных, в подколенных впадинах, иногда сопровождающееся увеличением селезенки; а также аналогичные краснухе экзантемы.

- Salmonella paratyphi B-injeel Д10, Д30, Д200
- Salmonella paratyphi B-injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- "Гастроэнтеритный" комплекс симптомов, например после употребления в пищу яиц и при отравлениях устрицами, мясными продуктами (применять в сочетании с Veratrum-Homaccord). Заболевания, сопровождающиеся высокой температурой и происходящим вследствие этого обезвоживанием. Запущенные ангины и гриппальные фарингиты, холециститы и другие инфекционные заболевания, сопровождающиеся потоотделением, бледностью кожных покровов, слабостью сердечной мышцы в сочетании с аритмией.
- В качестве дополнительного средства при заболеваниях фаз опухолеобразования. По Юлиану также при аденоидных выростах у детей.

- Salmonella typhi-injeel Д12, Д30, Д200
- Salmonella typhi-injeel forte Д6, Д12, Д30, Д200
- Заболевания, сопровождающиеся высокой температурой, геморрагический энтероколит, брадикардии, применяется также при "тифозных осложнениях". Метеоризм; холангит; холецистит. Бронхит, бронхопневмония; миокардит. Далее, редко встречающиеся осложнения в ходе заболевания Typhus abdominalis, такие, как, например, отит, конъюнктивит, кровоизлияния на сетчатке глаза, мышечная дегенерация, полиневрит, паротит, остеомиелит, панкреопатия, эндо-, мио, перикардит, гепатит, спондилит. Бессвязность мыслей, помутнение сознания, например при церебральном склерозе.

- Sanguis menstrualis-injeel Д12, Д30, Д200
- Sanguis menstrualis-injeel forte Д6, Д12, Д30, Д200
- Известно, что вместе с менструальной кровью выводятся гомотоксины, которые при наличии ретроградного застоя могут вызвать к жизни так называемый "эффект контрудара", например в климактерический период, при мигрени. Бессвязность мыслей, бред ревности, сердечные приступы и т.д. Sanguis menstrualis-injeel применим почти при всех видах адсорбированных токсинов, особенно при недостаточной детоксикации гистамина и недостаточной степени деструкции сексуальных гормонов; рекомендуется применять этот препарат также с целью локальной "очистки" от гомотоксинов, то есть как при сильных, острых, так и при ярко выраженных хронических заболеваниях; в безопасных дозах также при заболеваниях фаз опухолеобразования.

- Sanguis suis-injeel Д10, Д30, Д200
- Sanguis suis-injeel forte Д8, Д10, Д30, Д200
- Sanguis suis Д6; Д200 - в форме индивидуальной потенции
- Общетерапевтическое средство при дискразиях, тяжелых формах заболеваний, вызванных адсорбированными гомотоксинами; используется этот препарат в качестве "начального" средства при проведении курса лечения по детоксикации. Этот препарат предназначен также для использования при всех видах заболеваний фаз дегенерации, причем его использование в этих случаях должно осуществляться через определенные временные интервалы по отношению к остальным терапевтическим средствам Биотерапевтика-Хель: почти каждые 1-2-3 недели, так как кровь, в качестве основного средства "доставки", транспортирует также многочисленные гомотоксины, которые обращают терапевтическое воздействие в возвратный эффект.
- Показания в данном случае являются следующими: лейкомия, агранулоцитоз, анемии, аллергические состояния, дерматозы. Заболевания обмена веществ, в частности диабет и атеросклероз, затем хилестеринемия, полицитемия и т.д.

- Scarlatinum-injeel Д20, Д30, Д200
- Scarlatinum-injeel forte Д15, Д20, Д30, Д200
- Scarlatinum Д10-в форме индивидуальной потенции
- Осложнения после перенесенной скарлатины, такие, как нефриты и нефрозы, альбуминурия, эритроцитурия, склонность к отекам, миокардиты, иногда с нарушениями коронарного кровообращения, Angina pectoris, невроты сердца, Otitis media, "ревматоидные заболевания".

- Этот препарат воздействует преимущественно на почки и таким образом на кожный покров (в подтверждение взаимосвязи почки - кожа), применяется при чешуйчатых, с красными ободками проявлениях кожных "сухих" заболеваний, например при псориазе, в частности при пастозном типе конституции (в то время как Diphtherinum-injeel оказывает большой эффект на худощавых людей и имеет преимущественное воздействие на сердце). В основном у пациентов со слабой, мягкой соединительной тканью наблюдаются нарушения почечной деятельности (проф. Мюллер). Воздействие на функцию почек препарата Scarlatinum-injeel можно сравнить с воздействием на ту же функцию Berberis-injeel и Berberis Homaccord, при этом существуют широкие возможности сочетания этих двух препаратов.

- Berberis-Homaccord также подходит для пациентов с пастозным конституциональным типом. После применения сочетания этих препаратов часто наблюдается положительный обезвоживающий эффект при нефрогенных отеках. В то время как у Diphtherinum-пациента язык красный, "обложенный", пациент худой и страдает сердечными заболеваниями, у Scarlatinum-пациента чистый, гладкий "как лакированный" язык (малиновый язык, Apis-язык, Mercur. corros-язык), при этом язык пастозный, со склонностью к отеку. Таким образом, Scarlatinum-Injeel оказывает благоприятное воздействие на флегматиков, Diphtherinum-injeel применим при возбудимом, раздражительном конституциональном типе.

- Schweinepest-Serum-Injeel Д12, Д30, Д200
- Schweinepest-Serum-Injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Согласно симптоматической схожести при дифтероидных кишечных воспалительных процессах, сопровождающихся гастроэнтеритом, геморрагиями, пневмонией, септицемией. Cholera nostras и Cholera aestiva, сопровождающиеся рвотой и частым опорожнением желудка (частым стулом), в частности, в форме "рисовой" или "мучной похлебки".
- Serum ovile-injeel Д10, Д30, Д200

- Streptococcus haemolyticus-injeel Д12, Д30, Д200
- Streptococcus haemolyticus-injeel forte Д6, Д12, Д30, Д200
- Streptococcus haemolyticus Д5 - в форме индивидуальной потенции
- Ангина (часто со склонностью к абсцессам миндалин), Otitis media, флегмоны, эмпиема, мастит у рожениц, эндо-, мио-, пери- кардиты, пневмония, менингит, остеомиелит. Ранний хронический полиартрит. Хореатические вздрагивания, гримасы, тик, мышечная гипотония. Психические изменения, такие, как "атрофия" воли, невнимательность, непоследовательность, раздражительность, депрессия, психотические явления, галлюцинаторные психозы, ночные кошмары, топанье ногами. Применяется симптоматически при: отсутствии толерантности к шуму, свету, движению воздуха, а также при немотивированном плаче, подавленности, чувстве вибрации позвоночника при лежании вытянувшись, шуме в ушах, нарушениях зрения, ощущении соленого вкуса на губах.
- Streptococcus haemolyticus-injeel всегда следует применять в дополнение при лечении "аутоагрессивных" заболеваний, особенно в тех случаях, когда существует подозрение на участие стрептококков в патогенезе.
- Особенно хорошие результаты препарат дает в сочетании со Staphylococcus-injeel, Pyrogenium-injeel и Anthracinum-injeel.

- Staphylococcus-injeel Д12, Д30, Д200
- Staphylococcus-injeel forte Д6, Д12, Д30, Д200
- Staphylococcus Д5 - в форме индивидуальной потенции
- Хронические и хронически рецидивирующие заболевания, возбудителями которых являются стафилококки, чистые или в сочетании с другими возбудителями или же причиной заболевания может являться вторичное инфицирование стафилококком. Например: фурункул, карбункул, панариций, импетиго, блефарит, ячмень, Akne vulgaris et conglobata, язва голени, Pyoderma chronica papillaris et exulcerans, остеомиелит, флегмонозные деформации, Otitis media, цистопиелит, пневмония, энтероколит, миелит и др.
Общетерапевтическое средство при заболеваниях ретоксических фаз, причиной которых (заболеваний) являются яды, выделяемые стафилококком, например "аутоагрессивные" заболевания и комплексы симптомов (картины заболевания), в анамнезах которых встречаются какие-либо из вышеперечисленных заболеваний.

- Staphylococcus-injeel может дать положительный результат при применении его в следующих случаях: поражения миокарда, печени, почек и соединительных тканей, при заболеваниях щитовидной железы. Особенно хорошие результаты препарат дает в сочетании с Streptococcus haemolyticus-injeel и Pyrogenium- Injeel.

- Streptococcus viridans-injeel Д10, Д30, Д200
- Streptococcus viridans-injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Streptococcus viridans Д5 - в форме индивидуальной потенции
- Показания такие же, как и для Streptococcus haemolyticus- Injeel, однако следует особо отметить возможность применения Streptococcus viridans-injeel and forte при следующих заболеваниях: Endocarditis lenta и при Lenta-sepsis
- -симптомах; при вялых, медленнотекущих лихорадочных состояниях, при "тифозных" лихорадочных состояниях, при аутоагрессивных заболеваниях; при необходимости этот препарат может быть применен при заболеваниях фазы опухолеобразования в качестве препарата "на смену".

- *Struma cystica-injeel* Д10, Д30, Д200
- *Struma cystica-injeel forte* Д6, Д10, Д30, Д200
- Киста струмы; экспериментально и при другого рода увеличениях щитовидной железы, например при *Struma nodosa, colloides, cystica*. Постоперационная терапия во избежание рецидива заболевания.

- Struma nodosa-injeel Д10, Д30, Д200
- Struma nodosa-injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Узловатая струма (аденома), нередко в сочетании с кистой, при этом часто обызвествление и иногда кровотечения. Экспериментально также и при других формах струмы.

- Struma parenchymatosa-injeel Д10, Д30, Д200
- Struma parenchymatosa-injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Паренхиматозные, то есть диффузное и равномерное увеличение щитовидной железы (большей частью аномальное развитие сосудов и разрастание эпителия); экспериментально также и при других формах струмы.

- Sutoxol-injeel Д12, Д30, Д200
- Sutoxol-injeel forte Д6, Д12, Д30, Д200
- Sutoxol Д4; Д5; Д6; Д8; Д10; Д12; Д15; Д20; Д25; Д30; Д40; Д50; Д60; Д100; Д200; Д400; Д500; Д1000 - в форме индивидуальных потенций
- Тяжелые формы абсорбции гомотоксинов при заболеваниях (тканевых) фаз всех типов.
- Общетерапевтическое средство для (локальной) "очистки". Склонность к нагноению, фурункулам, карбункулам, лимфатизм, бели. Холангит, холецистит, холелитиаз. Экспериментально при хроническом аппендиците. При заболеваниях фазы опухолеобразования в качестве средства "на смену". Sutoxol-injeel во многих отношениях аналогичен Pyrogenium-Injeel и поэтому может применяться при тех же показаниях, что и Pyrogenium-injeel. Наряду с Psorinoheel, Grippe-Nosode-Injeel, Diphtherinum-injeel, Scarlatinum-injeel, Adeps suillus-injeel и Pyrogenium-injeel этот препарат является одним из наиболее важных при деструкции тяжелых форм абсорбированных гомотоксинов.

- Teratoma-injeel Д12, Д30, Д200
- Teratoma-injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Состояния после хирургического вмешательства по поводу удаления тератомы, тератоидной опухоли, кисты тератомы, в частности во избежание рецидивов.

- Tetanus-Antitoxin-Injeel Д12, Д30, Д200
- Tetanus-Antitoxin-Injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Tetanus-Antitoxin Д200 - в форме индивидуальных потенций
- Реакции на введение сыворотки, сверхчувствительность на введение сыворотки, болезненность введения сыворотки. Спастические заболевания любого вида, спастические парезы, иногда при множественном склерозе и паркинсонизме. По Юлиану при тонической судороге жевательной мускулатуры, заболевания паратиреоидной железы (околощитовидной железы) и нарушениях кальциевого обмена. Экспериментально при невралгиях и артрозах.

- Tonsillarprbpfe-injeel Д10, Д30, Д200
- Tonsillarprbpfe-injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Гидрогеноидная конституция. Тяжелая форма абсорбированных гомотоксинов (сутоксиров). Склонность к хроническим и хронически рецидивирующим ангинам, хроническим и хронически рецидивирующим синуситам. Фокальные заболевания, например невралгии, комплексы симптомов ревматического типа, нефропатии, нефрозы.
- Экспериментально при нарушениях коронарного кровообращения.

- Tonsillitis-Nosode-Injeel Д10, Д30, Д200
- Tonsillitis-Nosode-Injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Показания, аналогичные показаниям для Tonsillar-propfe-injeel and forte, но со "специализацией" в области заболеваний фазы импрегнации, в данном случае - ретоксической вследствие тонзиллита, лечение которого проводилось с помощью небиологических препаратов. Например: ревматический полиартрит, гломерулонефрит, нефрозы, эндомиокардиты, поражения миокарда и печени.

- Тохоплазмозе-Носод-Инжеел Д15, Д30, Д200
- Тохоплазмозе-Носод-Инжеел форте Д10, Д15, Д30, Д200
- Состояние после перенесенной Fetopathia toxoplasmotica, в частности: нарушения и замедления интеллектуального развития. Симптоматически при непереносимых головных болях, не поддающихся никакому воздействию; при эксцессивной гипертонии, мигрени. Психические заболевания, например состояния депрессии вследствие хронического энцефалита; энтероколиты, гепатиты, воспаления селезенки, миозит, орхит, некоторые кожные заболевания папулезного вида (типа) (Erythe-ma nodosum).
- Применять в качестве общетерапевтических инъекций "на смену", например в случаях отставания в развитии у детей (что бывает после ретоксической терапии гриппа, ангины), возможно применение этого препарата после ретоксической терапии таких заболеваний (ангины, гриппа) и у взрослых (замедленная реконвалесценция).

- Trichonomaden-Fluor-Injeel Д10, Д30, Д200
- Trichonomaden-Fluor-Injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Вагинит, эрозия шейки матки, зуд вульвы (ануса), жгучие боли во влагалище при попадании воды, при жгучем уретрите у мужчин. Эндометриты, параметриты, сальпингиты, оварииты и простатиты, особенно в тех случаях, когда имевшиеся у пациента гонорейи или уретрит (у мужчин) были излечены ретоксически. Применяется также при сухой слизистой оболочке носа и склонности к озене; при сердечных приступах, появившихся у пациента после ретоксической терапии белей.

- Tuberculinum-injeel Д12, Д30, Д200
- Tuberculinum-injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Tuberculinum Д1000 - в форме индивидуальной потенции
- По Юлиану показания для Tuberculinum восходят к туберкулезу и его специфическим проявлениям, при этом возможна успешная терапия псорических, сикотических, и, само собой разумеется, туберкулотоксических заболеваний. Воздействие Tuberculinum наиболее эффективно в том случае, когда этот препарат применяется согласно принципу изопатии, то есть не при непосредственно заболевании туберкулезом, но согласно принципу подобия при заболеваниях с аналогичными симптомами. Это относится ко всем нозодным препаратам, в особенности же к препарату Tuberculinum.

- Показания: психическая депрессия. Настроение плача, слез. Ипохондрия. Сонливость (в дневные часы). Ослабление памяти. Ухудшение при звуках музыки (Юлиан). Головная боль, причем "голова как в тисках" с тошнотой, периодически при влажной погоде, при запахе кофе (иногда), особенно в области головы, находящейся над правым глазом. Такого же рода головная боль у учащихся, ухудшение в этих случаях наступает при интеллектуальном напряжении. Непокойный сон, сопровождающийся кашлем, пробуждение с чувством страха. Конъюнктивит. Ячмень. Кератит. Фотофобия. Хронические отит и ринит. Изъязвление гортани. Афония. Бронхиальная астма, сухой плеврит сопровождающийся рефлекторным кашлем и болью в груди. Сердцебиение. Аритмия. Кожный покров на лице красно- фиолетового цвета (Papaver-injeel, а также Belladonna-injeel, Melilotus-injeel).

- Гипотония. Утомленность. Потение. Боль в области сердца. Далее, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические холецистит и энтероколит, хронический цистопиелит, нефрит, гидроцеле, метрит, показан препарат также при остром и хроническом артрите, остеохондрозе, при костных свищах. Следует особо отметить такие области показаний препарата, как чешуйчатые и сопровождающиеся зудом экземы с трещинами; импетиго, псориаз, красная волчанка, юношеские угри, рецидивирующая крапивница и потение по ночам, при котором белье окрашивается в желтый цвет. Характерна для *Tuberculinum* викариация от ревматических к кожным заболеваниям, общей характеристикой является смена различных фаз (заболеваний различных тканевых фаз).

- 
- Typhoidinum-injeel and forte typhy-injeel

cm. Salmonella


- Ulcus cruris-Nosode-Injeel Д12, Д30, Д200
- Ulcus cruris-Nosode-Injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Плохо заживающие язвы голени.
- Ulcus duodeni-Nosode-Injeel Д10, Д30, Д200
- Ulcus duodeni-Nosode-Injeel forte Д6, Д10, Д30, Д200
- Хроническая застарелая каллезная язва двенадцатиперстной кишки, хронически рецидивирующая язва двенадцатиперстной кишки с обострениями в период весны и осени; во избежание рецидивов. При язве двенадцатиперстной кишки с тенденцией к очень медленному заживлению; при локализации язвы двенадцатиперстной кишки (постбульбарной) вблизи Papilla Vateri; при вторичных осложнениях: отсутствие перекрытия желчных протоков и выводящих путей.

- *Ulcus ventriculi-Nosode-Injeel* Д10, Д30, Д200
- *Ulcus ventriculi-Nosode-Injeel forte* Д6, Д10, Д30, Д200
- Хронические и хронически рецидивирующие язвы желудка (вне зависимости от того, какая, повышенная или пониженная кислотность, или анацидитет наблюдается у пациента). При преканцерозе.
- *Urin. gravidar.* Д 200 - в форме индивидуальной потенции
- В некоторых случаях при неукротимой рвоте беременных и при других (ранних) проявлениях токсикозов беременности: слюнотечении, психических заболеваниях.

- Vaccinium-injeel Д20, Д30, Д200
- Vaccinium-injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
- Vaccinium Д200 - в форме индивидуальной потенции
- Осложнения, например слишком сильная реакция на вакцинацию оспы; применять этот препарат следует преимущественно в сочетании с Silicea-injeel, Sulfur-injeel, Hepar sulfuris-injeel, Mercurius solubilis Hahnemanni-injeel и Thuja-injeel.

- Далее, при головных болях, экзогенной депрессии, конъюнктивите, блефарите, воспалении радужной оболочки глаза; при гнойном рините, ревматическом полиартрите, ревматических парезах; возникшем после вакцинации нефрите, сопровождающемся альбуминурией и гематурией. Гиперменорея, ветряная оспа; особенно эффективен препарат при лечении опоясывающего лишая и Herpes simplex (комбинированная инъекция с Variolinum-injeel).

- При роже, флегмонах, острых экземах, прекардиальных болях, покалывании в груди, при эретизме сердца, потере аппетита и отвращении, вызываемом запахом или видом пищи (по Юлиану). Общетерапевтическое средство при тяжелых формах абсорбированных гомотоксинов и при септических заболеваниях (в сочетании с Traumeel, Baptisia-injeel, Lachesis-injeel, Echinacea-injeel forte, Pyrogenium-injeel).
- Экспериментально при афтах (в сочетании с Engystol, иногда также с Myrtillus-injeel, Beta vulgaris rubra- Injeel, Mucosa compos., и др.).

- 
- Varicellen-Nosode-Injeel Д12, Д30, Д200
 - Varicellen-Nosode-Injeel forte Д8, Д12, Д30, Д200
 - После перенесенной ветряной оспы;
осложнения после ветряной оспы;
высыпания на коже, аналогичные таковым
при ветряной оспе.

- Variolinum-injeel Д20, Д30, Д200
- Variolinum-injeel forte Д15, Д20, Д30, Д200
- Variolinum Д15; Д200; Д1000 - в форме индивидуальных потенций
- Гнойнички (пустулы) и пустуловидные высыпания на коже, в некоторых случаях сопровождающиеся кровотечениями, бляшковидные высыпания, такие, как Herpes simplex, Herpes zoster, Akne pustulosa, Impetigo contagiosa. Экзантемы со склонностью к кровоподтекам и петехиям, образование рубцов на коже, кожные нагноения, например панариций, Akne conglobata. По Юлиану, при сильных, непереносимых головных болях в области затылка, кашле с выделением клейкой, плотной, кровавой слизи; гнилостный, с привкусом меди, вкус во рту. Язык выпадает изо рта во время сна. Метеоризм, тимпания, рвота, диаррея, боли в спине, в частности пояснично-крестцовые, отдающие в живот. Боли в запястье, дневное потение (плохо пахнущий секрет). Иногда при пост-герпетических невралгиях.

- Variolinum-injeel применяется также в педиатрии в тех случаях, когда после вакцинации оспы наблюдается отставание в школе, развитие негативных черт характера. Общетерапевтическое средство при нагноениях любого вида, при тяжелых формах абсорбированных гомотоксинов и при заболеваниях, сопровождающихся высокой температурой; иногда, при необходимости, при септических заболеваниях (комбинированная инъекция в сочетании с Traumeel, Vaccinium-injeel, Pyrogenium- injeel, Anthracinum-injeel, Echinacea composita, forte; далее при энцефалите, возникшем вследствие вакцинации в сочетании с Arsenium album-injeel, Baptisia-injeel, Zincum metallicum-injeel, Zincum valerianum-injeel, Engystol), а также показания, аналогичные показаниям для Vaccinium-injeel.