

«Астана Медициналық Университеті» АҚ

# Презентация

## Тақырыбы: Дерматоздардағы көздің зақымдалуы




Орындаған: Өмірбекова А.  
Ж

Топ 719 ЖТД

# Жоспар:

- Қасаң қабықтың дерматиті:
- Қасаң қабықтағы контактты дерматит
- Қасаң қабықтағы атопиялық дерматит
- Қасаң қабықтағы себореялық дерматит
- Қасаң қабықтағы розацеа
- Сыртқы және ішкі ячмень
- Көздегі және көздің қасаң қабағындағы псориаз

# Қасаң қабықтың КОНТАКТТЫ дерматиті



Қасаң қабықтың жұқа болуына байланысты аллергияларға және сыртқы тітіркендіргіштерге, түрлі химиялық заттардың әсеріне қарсы туындаған терінің қабынулық процессі.

## Қасаң қабықтағы контактты дерматиттің себептері:

- Шаң
  - Кірпікке күтім жасауға арналған инструменттер және аппликаторлар
  - Декоративті косметика, бет кремдері, спрейлер (консерванттар, формальдегид)
  - Сусабындар (кокомидопропилбетаин)
  - Шашқа арналған бояулар (парафенилендиамин)
  - Офтальмологиялық ерітінділер (антибиотиктер, жергілікті бета-блокаторлар)
- **Симптомдары:**
  - Аллергиялық реакцияда-күйдіру сезімі(жжение);
  - Тітіркендіретін контактты дерматитте- күйдіру сезімі немесе теріні инемен сұққан секілді (покалывания)
  - Қышу және бөртпе – аллергиямен контакттан кейін 1-2 күн ішінде дамиды.
  - **Жоғарғы және төменгі қабақта – тері эритематозды, кеуіп-қабыршақтанған, көбінесе ісінумен.**

# Қасаң қабықтағы атопиялық дерматит



- Себептері:
- Генетикалық, экологиялық факторлар
- Аллергендер, химиялық заттар
- Кейбір азық-түлік түрлері
- Эмоциональді стресс

# Симптомдары:

- Қышу
- Ісіну
- Эритема
- Лихенизация
- Аздар кеуіп, қабыршақтанған
- **Созылмалы атопиялық дерматитте:**
- Периорбитальды қараю – «аллергиялық көгеру»
- Кератоконус –көздің мүйізді қабығының жұқаруы
- Алдыңғы субкапсулярлы катаракта



# Емі

- Оральды **антигистаминді препараттар** (гидроксизин немесе доксепин)
- Жұмсартатын жергілікті заттар және аз дозада қысқа курсты **кортикостероидтар** (терінің барьерлік функциясын қалыпқа келтіру)

# Қасаң қабықтағы себореялық дерматит



- Malassezia туыстастығының шартты-патогенді липофильді саңырауқұлағының әсерінен болатын қабынулық ауру.



# Симптомдары:

- Жоғарғы және төменгі қасаң қабықта – сарғыш майлы немесе ақшыл жіңішке шөгінділермен (чешуйки) жіңішке эритематозды бляшкалар болады.
- Сирек қышу
- Қабыршақтану
- Бұл симптомдар тек қасаң қабықта емес, бүкіл май бездеріне бай аймақтарда (бастың шашты бөлігінде, қаста, мұрын-ерін қатпарында, қолтықстында, шапта) кездеседі.

## Емі:

- Аз дозадағы қысқа әсерлі кортикостероидтар
- Кератолитикалық агенттер – салицил қышқылы

# Розацеа



- Көбінесе ересектерде кездесетін созылмалы ауру.

# Симптомдары

- Гиперемия
- Эритема
- Телеангиэктазия
- **Қасаң қабықта  
безеулік бөртпе  
пайда болады, кейін  
периорбитальды  
ісіну және эритема,  
шеттерінде  
телеангиэктазия.  
Кейінірек қалыңдап,  
біркелкі емес  
болады.**



# Емі

- Қасаң қабақтың гигиенасы (жылы компресстер 5-10 мин, массаж)
- Жүйелік тетрациклиндер
- Жергілікті метронидозол немесе 15% азелаин қышқылы
- Кейде асқынуда - кортикостероидтар

# Сыртқы ячмень

- Кірпік фолликулаларына және Цейс бездеріне стафилококкты инфекцияның таралуынан болатын жедел іріңді қабыну болып табылады.
- **Себептері:**
  - Стафилококктар
  - Организм әлсіздігі
  - Витамин жеткіліксіздігі
  - Суық тию
  - Қант диабеті



# Симптомдары:

- Қасаң қабықтың сыртқы шетінде гипермия
- Ауырсынумен ісіну және тығыздалу, кейде көз алмасында болады.
- 2-3 күндері тығыздану басылып, орнында ірің түзіледі
- Ал ячмень ұшы сарғыш түсте болады.
- 3-4 күндері ячмень ұшынан ірің шығып, өлген тіндер көрінеді.
- Осыдан кейін қабынулық процесс ақырындап азаяды.
- Ісіну мен қызару 5-7 күндері кетеді.

# Ішкі ячмень

- Мейбомий бездерінің жедел-іріңді қабынуы.



# Емі

- Конъюнктивальді мешокқа сульфаниламидтер және антибиотиктерді x 6-8 рет/күніне тамызу керек.
- Тығыздалу сатысында- күнде 70 % спиртпен сүртіледі.УФЧ және құрғақ жылу.
- Дене температурасының жоғарылауымен жүрсе-антибиотикотерапия.



# Көздегі псориаз - ксероз

- Себептері:
- Иммунитет әлсіздігі
- Бұрын ауыр вирусты және стрептококкты инфекциямен ауыруы.
- Тұқымқуалаушылы қ.



# Симптомдары:

- Көздің шырышты қабатында тамырлық сеточкалар пайда болады, ауыр жағдайда көз алмасы түгелімен қызарып тұрады.
- Жарыққа өте сезімтал.
- Көз алмасын қозғалтқанда ауырсыну.
- Жас ағудың күшеюі және дискомфорт.
- Көздің бұлыңғырланып, заттарды дұрыс көрмеуі, көрудің төмендеуі.
- Конъюнктива беткейінде пленка түзілуі.

# Емі:

- Жергілікті заттар қолдануға болмайды.
- Медикаментозды:
- Кортикостероидтар- кортизон немесе гидрокортизон(дәрігердің ұсынысымен ғана).
- Антибиотикотерапия - ішке

Назар аударғандарыңызға  
рахмет!!!

# Сұрақтар

- 1.Көздің толық көрмей қалу қаупі бар дерматоздың түрі?
- 2.Эритематозды бляшкалар қандай дерматитке тән?
- 3.Цейс бездерінің қабынулық ауруы қалай аталады?
- 4.Кератоконус және периорбитальды қараю симптомдары қандай дерматитте кездеседі?
- 5.Меймобий бездері қандай дерматитте жүреді?
- 6.Розацеа симптомдарын атаңыз?