




**ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**
имени академика Е. А. Вагнера

МАНИАКАЛЬНАЯ ФАЗА БИПОЛЯРНО- АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА

Выполнили:
студентки 409 и 410
группы
лечебного факультета
Энс М.А, Белякова О.С.

Г.Пермь, 2016

- БАР (МДП)- это группа психических заболеваний эндогенной природы, проявляющихся в виде периодически возникающих депрессивных и маниакальных приступов.



Историческая справка



Ж.П.Фальре

Ж.Г.Ф.
Байярже



Э.Крепелин

Характеристика

Начинается в 30- 40 лет, чаще страдают мужчины

Течение не прогрессирующее (в отличие от шизофрении)

Распада личности нет


Между приступами интермиссия

Эндогенное, хроническое, доброкачественное

Повреждение эмоциональной сферы



Признаки маниакальной фазы



Гипертимия

стойкое повышение настроения, сопровождающееся усилением социальной активности, повышением жизненного тонуса.



Тахифрения

расстройство мышления, при котором мышление носит поверхностный характер, мысли текут быстро, легко сменяют друг друга.



Гипербулия, гиперкинезия

патологическое повышение двигательной-волевой активности



Стадии маниакальной фазы


Гипоманиакальная



Выраженная мания



Маниакальное
неистовство



Двигательное успокоение



Реактивная стадия

Лечение маниакальной фазы

- ❖ нормотимики
- ❖ атипичные антипсихотики




Известные больные БАР

Сергей Есенин



Людвиг Ван Бетховен



**Спасибо за
внимание!**

