

Презентация на тему : "Инфекции, передаваемые половым путём"

Подготовила: Беленец Ксения

ИППП



**ИНФЕКЦИИ,
ПЕРЕДАВАЕМЫЕ
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ**

Венерические болезни (от *Венера* – богиня любви и красоты в римской мифологии) – это группа инфекционных болезней, возбудители которых передаются преимущественно половым путём.

В настоящее время насчитывается более 20 ИППП.

За последние годы количество заболеваний, передаваемых половым путём, увеличилось в несколько раз.

Одна из главных причин – это более свободный взгляд на секс и сексуальные отношения молодых людей.

Чем опасны БППП

поражением внутренних органов

параличом и нарушением психики

бесплодием

рождением больных детей и уродов

распадом семьи

вырождением нации



Статистика

за последние годы:

- Заболеваемость сифилисом возросла в 40 раз.
- Число случаев врождённого сифилиса возросло в 20 раз.
- БППП помолодели и ими начинают болеть с 12-14 лет.
- Наиболее часты эти заболевания у лиц в возрасте 20-21 года, на втором месте – 15-19-летние.

КАКИЕ ИНФЕКЦИИ ПЕРЕДАЮТСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ?

- Сифилис
- Гонорея
- Трихомониаз
- Мягкий шанкр
- Хламидиоз
- Уреаплазмоз
- Генетальный герпес
- Микоплазмоз
- ВИЧ



Сифилис считается самой страшной венерической болезнью. Возбудитель – *бледная трепонема* попадает в кровь не только половым путём, но и через порезы, ссадины, даже поцелуи, курение с больным одной сигареты, пользование предметами домашнего обихода (зубная щётка, ложка).

Признаки заболевания проявляются через
3-4 недели после контакта.

Пути заражения сифилисом

- **половой**
- **бытовой**
- **трансфузионный** (при прямом переливании крови (при этом сифилис начинается со второй стадии, т.н. сифилис д'Амбле или обзглавленный)
- **профессиональный**
- **при докуривании** одной сигареты, еда одной ложкой и т.д.
- **плацентарный**

Периоды заболевания

Первичный период характеризуется появлением эрозии или язвы (твёрдый шанкр) на месте внедрения *трепонемы*, чаще всего в области половых органов.

Вторичный период (через 1-2 месяца).
Появляется сыпь на коже туловища, подошв, ладонях, слизистой оболочке половых органов, постоянные головные боли, боли в костях, увеличиваются лимфатические узлы.

Третичный период характеризуется поражением кожи и слизистой оболочки, внутренних органов, костей, нервной системы, теряется чувствительность ног, поражаются зубы, проваливается нос.


Гонорея венерическое заболевание, вызываемое *гонококком*. Инкубационный период в среднем составляет 3-6 дней.

Признаки заболевания: боль и резь во время мочеиспускания, обильные гнойные выделения из мочеиспускательного канала, воспаление, частые позывы к мочеиспусканию.

Если заболевание не лечить, то возбудителем поражаются суставы, сердце, мозг.




Профилактика: после случайного полового контакта тщательно обмыть тёплой водой с мылом половые органы и прилегающие области, обработка и спринцевание раствором перманганата калия, профилактический медосмотр (мазок на гонококи), использование презервативов.

Соотношение больных гонореей мужчин и женщин 1,5 : 2,0





СПИД – синдром приобретённого иммунодефицита, вызывается вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).



История развития

Двадцать лет назад большинство медиков не знало, что такое ВИЧ. Первые сообщения о таинственной смертельной болезни появились в США в 1978 году. В 1983 году учёным удалось выделить возбудителя заболевания, получившего название ВИЧ. За двадцать лет в результате СПИДа, конечной стадии заболевания, вызываемого ВИЧ, умерло 16 миллионов человек.

СПИД – синдром приобретённого иммунодефицита. Это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и передающаяся при половом контакте и с кровью.

Пути передачи

При половом сношении

При переливании крови и её компонентов


При использовании медицинского инструмента, загрязненного кровью с возбудителем

При внутривенных инъекциях нестерильными шприцами среди наркоманов

Единственный путь борьбы со СПИДом – профилактика.

Пути, которыми вирус может передаваться от ВИЧ-инфицированных и больных СПИД;

- при переливании зараженной крови;
- при незащищенных сексуальных контактах;
- через инфицированные шприцы;
- от матери ребенку: во время беременности, во время родов и при кормлении грудью.



Что такое ВИЧ?

ВИЧ - это сокращенное название вируса иммунодефицита человека, т. е. вируса, поражающего иммунную систему. Разрушая иммунную систему человека, этот вирус способствует развитию у него других инфекционных заболеваний, так как иммунная система теряет способность защитить организм от болезнетворных микроорганизмов. Человек, инфицированный ВИЧ, со временем становится более восприимчивым даже к таким микроорганизмам, которые для здоровых людей не представляют никакой опасности.



Пути передачи ВИЧ

ВИЧ может передаваться только тремя путями:

- **через кровь**
- **половым путем**
- **от матери к ребенку**



Вирус ВИЧ – инфекции не передается:

- укусы комаров и прочих насекомых,
- воздух,
- рукопожатие (при отсутствии открытых повреждений кожи),
- поцелуй (любой, но при отсутствии кровоточащих повреждений и трещин на губах и в полости рта),
- посуду,
- одежду,
- пользование ванной, туалетом, плавательным бассейном и т. п.

Периоды ВИЧ-инфекции

Инкубационный период продолжается от 3 дней до нескольких месяцев.

Период первичных проявлений длится от нескольких дней до 2,5 месяца, но может затянуться до 1 года.

Период вторичных проявлений продолжается от нескольких месяцев до 8-10 лет.

Период поражений продолжается от нескольких месяцев до 3-5 лет.

Главной причиной заболеваемости и смертности от СПИДа является не сам вирус, а другие инфекции и заболевания, которым организм не может сопротивляться в результате действия ВИЧ-инфекции.

1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией наказывается ограничением свободы на срок до трёх лет, либо арестом на срок от трёх до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
2. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшем о наличии у него этой болезни, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.



**Вакцины от
ВИЧ-инфекции
НЕТ!**

**Радикального
метода лечения
НЕТ!**

Ты сам выбираешь
свой путь!

**СПИД неизлечим
и неизбежно ведёт
к смерти!**





Статистика ВИЧ / СПИДа в Украине

- На сегодняшний день количество зарегистрированных в Украине случаев ВИЧ-инфекции превысило 160 тыс. человек.
- 25% людей с диагнозом ВИЧ-инфекция – моложе 20 лет.
- Темпы распространения ВИЧ-инфекции в Украине – одни из самых высоких в мире.
- Украина занимает первое место в Европе по темпам распространения ВИЧ-инфекции среди молодежи 15 – 24 лет.

Стоит провериться на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП)

если ты думаешь, что:



Когда провериться на ИППП

- Имела место любая форма незащищенного полового акта.
- Создание пары с новым партнером, даже если до этого вы предохранялись и проводили профилактику.
- Планирование беременности.

Как узнать ИППП

Многие протекают бессимптомно

- Зуд и жжение, иногда боли в интимной зоне.
- Новые элементы в области половых органов и заднего прохода-покраснение, прыщики, язвы.
- Выделения из половых органов, запах.
- Частое, болезненное мочеиспускание.
- Увеличение лимфатических узлов, особенно в паховой области.
- Дискомфорт во время полового акта.

Как проверить?

Прийти к врачу вместе с партнером. ИППП можно выявить с помощью одного или нескольких методов.

- анализы крови (иммуноферментный анализ);
- бактериологические исследования (посев);
- ДНК-анализы (ПЦР);
- микроскопические исследования (мазок на ИППП).

Как уберечь себя и партнера от ИППП?

- Самое безопасное, если у тебя будет только один партнер (который не инфицирован и не имеет других половых партнеров).
- Одним из наиболее доступных и эффективных методов защиты от заражения половыми инфекциями во время вагинального, орального и анального секса является использование презервативов.

Профилактика ЗППП

Чем опасны ЗППП :

- ✦ поражением внутренних органов
- ✦ параличом и нарушением психики
- ✦ бесплодием
- ✦ рождением больных детей и уродов
- ✦ распадом семьи
- ✦ вырождением нации

Профилактика ЗППП :

- ✦ использование презервативов
- ✦ постоянные сексуальные партнеры
- ✦ здоровый образ жизни
- ✦ своевременное обращение при появлении первых симптомов заболеваний в медицинское учреждение.

Самолечение недопустимо!



Профилактика ИППП:

- ❖ отказ от случайных половых связей, особенно с группой риска по половым инфекциям
- ❖ использование презерватива в случае секса с партнером, чей статус в отношении половых инфекций неопределен
- ❖ обращение к врачу при любых симптомах подозрительных на половую инфекцию,
- ❖ информирование населения о ИППП
- ❖ работа с группами повышенного риска (наркоманы, работники коммерческого секса, подростки, лица с психическими отклонениями)

Выводы:

1. ЗППП Наносят значительный вред здоровью человека, отрицательно сказываются на потомстве.
2. Низкая осведомленность населения о заболеваниях, передающихся половым путем, способствуют росту уровня заболеваемости венерическими болезнями.

Латексные презервативы не только предохраняют от нежелательной беременности, но и служат барьерным средством профилактики ИППП, включая ВИЧ/СПИД.

Однако, средства контрацепции, которые на 100% защитят от ИППП не существует

Поэтому на первое место в профилактике ИППП выходит культура сексуального поведения.