

Первая помощь при отравлении психоактивными веществами

Презентация к уроку ОБЖ

9 класс

Учитель Чиликова С.А.

При передозировке, частом употреблении организм и ЦНС не справляется с массивным поступлением психоактивных веществ, развивается интоксикация.

Она выражается в усилении признаков наркотического опьянения, в частности типичны рвота, резкое повышение АД, судороги, ярко выраженные галлюцинации, заторможенность вплоть до комы.

В этом состоянии высока вероятность смертельного исхода либо вследствие несчастного случая (под воздействием галлюцинаций) либо из-за тотальных нарушений в работе органов и систем.



Признаками передозировки являются:

1. Потеря сознания.
2. Резкая бледность.
3. Неглубокое и редкое дыхание.
4. Плохо прощупываемый пульс.
5. Отсутствие реакции на внешние раздражители.
6. Рвота.

Этапы оказания первой помощи при передозировке ПАВ

- Вызвать «Скорую помощь»
- Повернуть на бок
- Очистить дыхательные пути от слизи и рвотных масс
- Следить за характером дыхания до прибытия врачей.
- В случае замедления дыхания выполнить искусственное дыхание.

Первая помощь при передозировке ПАВ:

1. При появлении признаков отравления вызвать скорую помощь.
2. Уложить пострадавшего на бок, вывести вперед нижнюю руку.
3. Освободить грудную клетку и шею от сдавливающей одежды, обеспечить приток свежего воздуха.
4. Если пострадавший в сознании, необходимо промывать желудок каждые 30–40 минут до приезда скорой помощи. Для промывания используют прохладную слабосоленую кипяченую или минеральную негазированную воду. Рвотный рефлекс вызывают



Первая помощь при передозировке наркотиков:

5. При заторможенности, спутанности сознания поднести к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом. При отсутствии нашатыря растереть мочки ушей, пощекотать нозевые ходы. Подобные действия стимулируют дыхательный и сосудодвигательный центры, препятствуют утрате сознания.

6. При отсутствии дыхания и кровообращения приступайте к искусственному дыханию и непрямому массажу сердца. Можно обратиться к очевидцам, возможно среди них есть лица с медицинским образованием.

Чего нельзя делать?

1. Оставлять пострадавшего одного, в любой момент может возникнуть необходимость в сердечно-легочной реанимации.
2. Давать человеку психостимулирующие препараты, алкоголь, энергетические напитки.
3. Отказываться от госпитализации в стационар, если стало лучше после действий бригады скорой помощи. Вводимые antidotes имеют меньший срок действия, чем наркотики, поэтому улучшение состояния может вскоре смениться комой.