


«Менингококковая инфекция Профилактика осложнений»



Перспективный календарь прививок России



2020

Новая ТБ, ВИЧ, CMV, ВЭБ, H.pylori

2015

Герпес, РС,

ХИБ, пневмококковая, бесклеточная коклюшная, ВПЧ, ротавирус, в.оспа, менингококковая

2010

Сегодня в календаре: БЦЖ, гепатит В АКДС, ИПВ/ОПВ, КПК, грипп

























Дополнение к протоколу патологоанатомического исследования № 3 Д
от "9" февраля 2011 года.


Магданова Айсулпан Рамзиевна. 6 мес 29 дней.




Кровоизлияния в слизистую трахеи и бронхов



Кровоизлияния в надпочечники




Гиперплазия
тимуса




Гиперплазия

тимуса


(на разрезе)




Селезенка




ГОЛОВНОЙ МОЗГ



Мелкоточечные кровоизлияния в ткань головного мозга



Мелкоточечные кровоизлияния
в ткань головного мозга



ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА МЕНИНГОКОККОВУЮ ИНФЕКЦИЮ

- **Менингококцемия**
 - **Подъем температуры до высоких цифр, появление симптомов интоксикации, геморрагическая сыпь**
 - **Менингит**
 - **Острое начало заболевания, гипертермия, вялость или возбуждение, судороги, повторная рвота, головная боль, менингеальные СИМПТОМЫ**
- 

ВРАЧУ НЕОТЛОЖНОЙ, СКОРОЙ ПОМОЩИ, УЧАСТКОВОМУ ВРАЧУ

- 1. Жаропонижающие средства (анальгин 50% - 0,1 мл/год жизни; димедрол 1% или при возбуждении – пипольфен 2,5% 0,2 мл./на год жизни в/м)
 - 2. Левомецетин – сукцинат натрия 25 мг/кг массы, разовая доза в/м
 - 3. Преднизолон (для предупреждения шока) 2 – 3 мг/кг в/м или в/в
 - 4. При выраженном менингеальном синдроме – Лазикс 1-2 мг/кг в/м
 - 5. При возбуждении, судорогах – Реланиум в/м или в/в детям до
- 

ПРИЗНАКИ РАЗВИТИЯ ГИПЕРТОКСИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

- Уровень артериального давления
- Частота и качество пульса
- Частота дыхания
- Состояние кожных покровов
- Уменьшение диуреза
- Все эти данные должны быть указаны в направлении



ПРИЗНАКИ РАЗВИТИЯ ГИПЕРТОКСИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

- Нарастание бледности и цианоза, похолодание и синюшность кистей и стоп, увеличение геморрагической сыпи (особенно на лице и туловище), появление сливных элементов сыпи, падение А/Д ниже 80 мм/рт.ст.
- мягкий частый пульс, появление одышки и дыхательных расстройств
- отсутствие мочеиспускания в течение 6 часов
- возбуждение или затемнение и утрата сознания – являются признаками гипертоксической формы менигококковой инфекции



