

Иридодиагностика-3

Иридодиагностика

Иридодиагностика - метод исследования состояния организма по радужной оболочке.

Каждый орган имеет свою локализацию на радужке, т.н. проекционную зону, куда через висцеральные центры головного мозга направляет информацию о своем неблагополучии.

Эти сигналы и способствуют, в первую очередь, появлению на радужной оболочке иридологических знаков, помогающих осуществлять диагностику многих заболеваний.

Simon A., Worthen D. M., Mitas J. A.
An evaluation of iridology.
JAMA, 1979, 242(13): 1385-1389

- Диагностировали поражение почек.
- Иридологи уверяют, что они способны диагностировать болезни почек на ирисе (ок. 6 час.)
- Область почек на ирисе легко фотографировать.
- В качестве эталона сравнения (золотого стандарта) был выбран уровень креатинина в плазме крови, который надежно тестирует функцию почек.

Отбор пациентов

- **Контрольная группа:**
- **95 пациентов (55 мужчин и 40 женщин) с нормальной функцией почек**
- **Возраст: от 21 до 80 лет**
- **Уровень креатинина в плазме крови ниже 1,2 мг/дл: 0,5 – 1,2 мг/дл**
- **В истории болезни нет никаких указаний на дисфункцию почек**
- **6 человек – гипертоники,
3 - диабетики**

Больные

- 48 человек (30 мужчин и 18 женщин) с дисфункцией почек
- Возраст: от 21 до 74 лет
- Уровень креатинина в плазме крови выше 1,5 мг/дл: от 1,6 до 16,0 мг/дл
- 7 человек – гипертоники,
7 - диабетика

Проверка иридодиагностики заболевания почек JAMA 242(1979)1385-1389

Мнение иридолога С	Эталонный метод (содержание креатина в плазме крови)		Всего
	> 1,5 мг/дл	< 1,2 мг/дл	
	Больные	Здоровые	
Больные (+)	42	84	128
Здоровые (-)	6	11	17
Всего	48	95	143

Способен ли иридолог С диагностировать почечную недостаточность? Каковы чувствительность и специфичность его диагностической способности? Что лучше он способен диагностировать: наличие или отсутствие почечной недостаточности?