

# Иррациональные неравенства.

■ ■ ■

**Определение.** *Неравенство, содержащее переменную под знаком корня или под знаком возведения в дробную степень, называется иррациональным неравенством.*

**ПРИМЕР**

$$\sqrt{x+3} > x+1; \sqrt{x^2-5x+3} < \sqrt{x} + \frac{1}{x^2}; x^{\frac{3}{2}} - x^{\frac{1}{3}} < 2.$$

При решении иррациональных неравенств, как и иррациональных уравнений, корни четной степени рассматриваются как арифметические, а корни нечетной степени — на всей числовой оси.

Иррациональные неравенства решаются в основном методом возведения в степень. Но при этом надо знать и использовать следующие утверждения:

1) Если неравенство, обе части которого неотрицательны при всех допустимых значениях переменной, возвести в квадрат (или в любую четную степень) и сохранить его знак, то получим неравенство, равносильное данному.

Другими словами, если дано неравенство  $f_1(x) > f_2(x)$ , причем при всех  $x$  из ОДЗ (область допустимых значений) переменной  $f_1(x) \geq 0$  и  $f_2(x) \geq 0$ , то неравенство  $(f_1(x))^{2n} > (f_2(x))^{2n}$  равносильно данному.

2) Если обе части неравенства возвести в нечетную натуральную степень и сохранить его знак, то получим неравенство, равносильное исходному. Иначе говоря, если дано неравенство  $f_1(x) > f_2(x)$ , то неравенство  $(f_1(x))^{2n+1} > (f_2(x))^{2n+1}$  равносильно данному.

Используя эти два утверждения можно свести решение иррациональных неравенств к решению рациональных неравенств или систем рациональных неравенств.

**ПРИМЕР**

1. Решим неравенство  $\sqrt{x-1} < 3-x$ .




Рис. 42

*Решение.* Область допустимых значений переменной определяется из условия  $x - 1 > 0$ . Но по смыслу данного неравенства должно выполняться и условие  $3 - x > 0$ , поскольку левая его часть — арифметический корень. При этих условиях обе части неравенства неотрицательны, поэтому можно использовать метод возведения в квадрат. Если обе части исходного неравенства возвести в квадрат, то, учитывая указанные выше условия, получим следующую систему неравенств:

$$\begin{cases} x - 1 \geq 0, \\ 3 - x > 0, \\ x - 1 < (3 - x)^2 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x > 1, \\ x < 3, \\ (x - 2)(x - 5) > 0. \end{cases}$$

Отсюда  $1 < x < 2$ , т. е. решением исходного неравенства является множество  $[1; 2)$  (рис. 42).

*Ответ:*  $[1; 2)$ .

**ПРИМЕР**

2. Решим иррациональное неравенство  $\sqrt{x-1} > 3-x$ .

*Решение.* Область определения неравенства задается условием  $x-1 > 0$ , т. е.  $x > 1$ . Правая часть неравенства обращается в нуль при  $x=3$  и она отрицательна при  $x > 3$ . Учитывая эти условия утверждаем, что данное неравенство равносильно совокупности двух систем:

$$1) \begin{cases} 1 < x < 3, \\ x-1 > (3-x)^2; \end{cases} \quad 2) \begin{cases} x > 3, \\ \sqrt{x-1} > 3-x. \end{cases}$$

Решим первую систему:

$$\begin{cases} 1 < x < 3, \\ x-1 > (3-x)^2 \end{cases} \text{ или } \begin{cases} 1 < x < 3, \\ (x-2)(x-5) < 0. \end{cases}$$

Решением первой системы является промежуток  $(2; 3]$ .

Решим вторую систему:  $\begin{cases} x > 3, \\ \sqrt{x-1} > 3-x. \end{cases}$

Решением этой системы являются все значения  $x$  из промежутка  $(3; +\infty)$ , так как значение выражения  $(3-x)$  отрицательно, а левая часть  $\sqrt{x-1}$  положительна. Объединяя решение первой системы с решением второй системы устанавливаем, что решением исходной системы будет промежуток  $(2; +\infty)$  (рис. 43).




Рис. 43

*Ответ:*  $(2; +\infty)$ .

Основные равносильные соотношения, применяемые для решения иррациональных неравенств:

$$1. \sqrt[2n]{f(x)} < \sqrt[2n]{g(x)} \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > 0, \\ f(x) < g(x). \end{cases}$$

$$2. \sqrt[2n]{f(x)} > \sqrt[2n]{g(x)} \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) \geq 0, \\ f(x) > g(x). \end{cases}$$

$$3. \sqrt[2n+1]{f(x)} > \sqrt[2n+1]{g(x)} \Leftrightarrow f(x) > g(x).$$

$$4. \sqrt[2n+1]{f(x)} < \sqrt[2n+1]{g(x)} \Leftrightarrow f(x) < g(x).$$

$$5. \sqrt[2n+1]{f(x)} < g(x) \Leftrightarrow f(x) < [g(x)]^{2n+1}.$$

$$6. \sqrt[2n+1]{f(x)} > g(x) \Leftrightarrow f(x) > [g(x)]^{2n+1}.$$

$$7. \sqrt[2n]{f(x)} < g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > 0, \\ g(x) > 0, \\ f(x) < [g(x)]^{2n}. \end{cases}$$

$$8. \sqrt[2n]{f(x)} > g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > 0, \\ g(x) < 0, \\ g(x) > 0, \\ f(x) > [g(x)]^{2n}. \end{cases}$$


$$9. \frac{\sqrt[n]{f(x)}}{g(x)} > a \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) > 0, \\ \sqrt[n]{f(x)} > a \cdot g(x), \\ g(x) < 0, \\ \sqrt[n]{f(x)} < a \cdot g(x). \end{cases}$$

Приведем примеры решения иррациональных неравенств с использованием данных соотношений.

**ПРИМЕР**

3. Решим неравенство  $\sqrt{x^2 - x - 12} < x$ .

*Решение.* Применим соотношение (7), тогда получим:



$$\begin{cases} x^2 - x - 12 \geq 0, \\ x > 0, \\ x^2 - x - 12 < x^2 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} (x - 4)(x + 3) \geq 0, \\ x > 0, \\ x > -12. \end{cases}$$

Множество решений системы неравенств показано на рисунке 44.

*Ответ:*  $[4; +\infty)$ .

Рис. 44

**ПРИМЕР**

4. Решим неравенство  $\sqrt{x+2} > \sqrt{8-x^2}$ .

*Решение.* Применяя соотношение (2) получим:

$$\begin{cases} x+2 \geq 0, \\ 8-x^2 \geq 0, \\ x+2 > 8-x^2 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x \geq -2, \\ x^2-8 \leq 0, \\ x^2+x-6 > 0 \end{cases}$$

$$\text{или} \quad \begin{cases} x \geq -2, \\ (x-2\sqrt{2})(x+2\sqrt{2}) \leq 0, \\ (x-2)(x+3) > 0. \end{cases}$$

Множество решений системы неравенств показано на рисунке 45.

*Ответ:*  $(2; 2\sqrt{2}]$ .




Рис. 45



5. Решим неравенство  $\sqrt{-x^2 + 6x - 5} > 8 - 2x$ .

*Решение.* Применим соотношение (8), тогда данное неравенство сведется к совокупности двух систем неравенств:

$$\begin{cases} -x^2 + 6x - 5 \geq 0, \\ 8 - 2x < 0 \end{cases} \text{ или } \begin{cases} 8 - 2x > 0, \\ -x^2 + 6x - 5 > (8 - 2x)^2. \end{cases}$$

Решим каждую систему в отдельности.

$$1) \begin{cases} -x^2 + 6x - 5 \geq 0, \\ 8 - 2x < 0 \end{cases} \text{ или } \begin{cases} x^2 - 6x + 5 \leq 0, \\ 2(4 - x) < 0 \end{cases} \text{ или}$$

$$\begin{cases} (x - 1)(x - 5) \leq 0, \\ 4 - x < 0 \end{cases} \text{ или } \begin{cases} 1 < x < 5, \\ x > 4. \end{cases}$$

Решением системы неравенств является промежуток  $(4; 5]$  (рис. 46).

$$2) \begin{cases} 8 - 2x > 0, \\ -x^2 + 6x - 5 > (8 - 2x)^2 \end{cases} \text{ или } \begin{cases} 4 - x \geq 0, \\ 5x^2 - 38x + 69 < 0 \end{cases} \text{ или}$$

$$\begin{cases} x \leq 4, \\ 5(x - 3)\left(x - \frac{23}{5}\right) < 0 \end{cases} \text{ или } \begin{cases} x \leq 4, \\ 3 < x < \frac{23}{5}. \end{cases}$$



Рис. 46




Рис. 47

Решением системы неравенств является промежуток  $(3; 4]$  (рис. 47). Объединив решения двух систем неравенств, получим решение исходного неравенства — промежуток  $(3; 5]$ .

Ответ:  $(3; 5]$ .

**ПРИМЕР**

6. Решим неравенство  $\sqrt{5x^2 + 10x + 1} > 7 - x^2 - 2x$ .

*Решение. Первый способ.* Применим непосредственно соотношение (8), тогда получим неравенство четвертой степени. Поэтому данное неравенство предварительно запишем в следующем виде  $\sqrt{5(x^2 + 2x) + 1} > 7 - (x^2 + 2x)$  и введем обозначение:  $y = x^2 + 2x$ . Тогда последнее неравенство примет вид  $\sqrt{5y + 1} > 7 - y$ .

Применяя соотношение (8) из последнего неравенства получим две системы неравенств:

$$1) \begin{cases} 5y + 1 \geq 0, \\ 7 - y < 0 \end{cases} \text{ или } \begin{cases} 5y \geq -1, \\ y > 7 \end{cases} \text{ или } \begin{cases} y \geq -\frac{1}{5}, \\ y > 7. \end{cases}$$

Отсюда получим  $y > 7$ . Решением системы неравенств является промежуток  $(7; +\infty)$ .

$$2) \begin{cases} 7 - y \geq 0, \\ 5y + 1 > (7 - y)^2 \end{cases} \text{ или } \begin{cases} y < 7, \\ y^2 - 19y + 48 < 0 \end{cases} \text{ или}$$

$$\begin{cases} y < 7, \\ (y - 3)(y - 16) < 0 \end{cases} \text{ или } \begin{cases} y < 7, \\ 3 < y < 16. \end{cases}$$

Множеством решений системы неравенств будет промежуток  $(3; 7]$  (рис. 48). Следовательно, объединив решения двух этих систем, имеем  $y > 3$ .

Подставив вместо  $y$  его обозначение  $x^2 + 2x$ , имеем:  $x^2 + 2x > 3$ . Решим последнее неравенство:  $x^2 + 2x - 3 > 0$  или  $(x - 1)(x + 3) > 0$ . Решением неравенства является множество  $(-\infty; -3) \cup (1; +\infty)$  (рис. 49).




Рис. 48



Рис. 49

**Второй способ.** Умножим обе части неравенства  $\sqrt{5x^2 + 10x + 1} > 7 - 2x - x^2$  на число  $5 > 0$ , тогда получим равносильное неравенство  $5\sqrt{5x^2 + 10x + 1} > 35 - 5x^2 - 10x$ . Полученное неравенство запишем в виде:

$$5\sqrt{5x^2 + 10x + 1} > 36 - (5x^2 + 10x + 1).$$

Введем новую переменную:  $\sqrt{5x^2 + 10x + 1} = a$  ( $a > 0$ ). Тогда последнее неравенство примет вид:  $5a > 36 - a^2$  или  $a^2 + 5a - 36 > 0$ . Решением неравенства является множество  $(-\infty; -9) \cup (4; +\infty)$ .

Так как  $a > 0$ , то рассмотрим только множество  $(4; +\infty)$ . Итак  $a > 4$ , значит,  $\sqrt{5x^2 + 10x + 1} > 4$ . Возведем обе части неравенства в квадрат, получим:  $5x^2 + 10x + 1 > 16$  или  $5x^2 + 10x - 15 > 0$ . Сократим полученное неравенство на 5.  $x^2 + 2x - 3 > 0$ , решением этого неравенства является множество  $(-\infty; -3) \cup (1; +\infty)$ .

*Ответ:*  $(-\infty; -3) \cup (1; +\infty)$ .

**ПРИМЕР**

7. Докажем неравенство  $\frac{x+y}{2} > \sqrt{xy}$ , где  $x > 0, y > 0$ .

*Доказательство. Первый способ.* Сумму  $x + y$  преобразуем следующим образом:

$$x + y = (\sqrt{x})^2 + (\sqrt{y})^2 - 2\sqrt{x}\sqrt{y} + 2\sqrt{xy} = (\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 + 2\sqrt{xy}.$$

Тогда  $\frac{x+y}{2} = \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 + 2\sqrt{xy}}{2} = \frac{1}{2}(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 + \sqrt{xy}$ . Равенство достигается, если  $x = y$ .

Следовательно, правая часть данного неравенства состоит из суммы, где первое слагаемое неотрицательно, а второе слагаемое есть правая часть доказываемого неравенства.

Поэтому очевидно, что  $\frac{x+y}{2} > \sqrt{xy}$ . Равенство достигается, если  $x = y$ .

*Второй способ.* Составим разность  $\frac{x+y}{2} - \sqrt{xy}$  и найдем ее знак:  $\frac{x+y}{2} - \sqrt{xy} = \frac{x+y-2\sqrt{xy}}{2} = \frac{(\sqrt{x}-\sqrt{y})^2}{2}$ . Неравенство  $(\sqrt{x}-\sqrt{y})^2 > 0$  верно при любых неотрицательных значениях  $x$  и  $y$ . Значит  $\frac{x+y}{2} > \sqrt{xy}$ .

Домашнее задание:

Краткий конспект.

Решить №15.1-№15.4 (все первые задания)

### Упражнения

#### А

Решите неравенства (15.1—15.3):

15.1. 1)  $\sqrt{x} > 2$ ;      2)  $\sqrt{x} < 5$ ;      3)  $\sqrt[3]{x} > 3$ ;      4)  $\sqrt[3]{x} < 2$ .

15.2. 1)  $\sqrt{x+1} > 2$ ;      2)  $\sqrt{1-x} < 4$ ;      3)  $\sqrt{3x+1} > 1$ ;      4)  $\sqrt{2x-1} < 3$ .

15.3. 1)  $\sqrt{3x-8} < -2$ ;      2)  $\sqrt[3]{x+2} < -5$ ;  
3)  $\sqrt{2x+1} > 8$ ;      4)  $(x-12)\sqrt{x-3} < 0$ .

#### В

Решите неравенства (15.4—15.6):

15.4. 1)  $\sqrt{x^2+x-2} < 2$ ;      2)  $\sqrt{x^2+x+1} < 1$ ;

3)  $\sqrt{x^2+3x} > 4$ ;      4)  $\sqrt{x^2-5x} > 3$ .

15.5. 1)  $\sqrt{2x-1} > x-2$ ;      2)  $\sqrt{2x+1} < x-1$ ;

3)  $x+2 < \sqrt{x+14}$ ;      4)  $x-3 < \sqrt{x+27}$ .