

Психопатологическая семиотика. Психопатологическая
синдромология. Определение.
Первая помощь при эпилепсии.



**ПРЕЗЕНТАЦИЮ ВЫПОЛНИЛА СТЕПАНОВА АННА,
СТУДЕНТКА 2 КУРСА, ГРУППЫ ЛОГО-2**

Психопатологическая семиотика


- **Психопатологическая семиотика** (от греч. semeion — признак) — это систематическое описание признаков, феноменов психических заболеваний, которая является важнейшей составной частью общей **психопатологии**, поскольку именно в **семиотике** отражаются наиболее специфические особенности данной группы заболеваний.



Психопатологическая синдромология

- Психопатологический синдром (иногда называемый психопатологическим симптомокомплексом) - это повторяющаяся совокупность симптомов, объединённых единством патогенеза, общими механизмами происхождения и характеризующих текущее состояние лица с психическим расстройством.
- Психопатологический синдром — одна из важнейших диагностических категорий психиатрии. Традиционно выделяются простые и сложные, большие и малые психопатологические синдромы.

ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ



Первая помощь при эпилепсии



- 1. Во время приступа больного нельзя переносить, кроме тех случаев, когда ему может угрожать опасность.
- 2. При повышенном слюноотделении и рвоте больного надо положить на бок или повернуть его голову на бок. Делать это следует мягко, не применяя силу.
- 3. Не пытайтесь ограничивать движения человека.
- 4. Не пытайтесь открыть рот человека. Важно понимать, что прикусывание языка возникает в самом начале приступа. Если больной прикусил язык или щёку, то травма уже произошла. Дальнейшие попытки открыть рот бесполезны и могут привести к травмам слизистой полости рта.
- 5. Нужно подождать, когда закончится приступ, находясь рядом с больным и внимательно наблюдая за его состоянием, чтобы правильно и полно описать проявления приступа врачу.
- 6. Очень важно засечь время, когда начался приступ, поскольку длительность приступа или серий приступов, приближающаяся к 30 минутам, означает, что больному входит в угрожающее его жизни состояние — эпилептический статус.
- 7. После приступа, как правило, больной чувствует слабость, истощение или засыпает. В этом случае не надо его тревожить, чтобы дать возможность восстановиться нервным клеткам. Нужно убедиться, что приступ закончился и у больного наступил постприступный сон. Пациент без сознания, не реагирует на окружающих, «не пробуждается»; пациент после приступа реагирует как человек, которому «мешают спать». Необходимо оставаться рядом с больным и дожидаться, когда закончится период спутанности сознания (если таковая развивается) и сознание полностью восстановится.

Первая помощь при эпилепсии

КАК СПРАВИТЬСЯ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИСТУПАМИ

Полезная информация в целях Вашей безопасности

Общение - ключ к получению помощи

Совместная работа с доктором для определения рисков и составления плана действий

Получить ответы на вопросы:



Какой вид эпилепсии у меня?



Как я могу предотвратить приступы в будущем?



Что мне делать, если я забыл принять лекарство?



Каков риск внезапной смерти



Постарайся больше взаимодействовать с людьми с таким же диагнозом. Ты не один. Узнай у своего врача о наличии в городе сообществ по борьбе с эпилепсией.

Депрессия может быть у 5 из 10 человек с эпилепсией и приступами. Если ты чувствуешь, что у тебя депрессия, поговори с доктором.



Что мне делать при возникновении 2-го приступа?



Какие наиболее распространенные побочные эффекты лекарственных препаратов?



Какие есть другие методы лечения, если лекарство не помогает?

Синдром внезапной смерти ежегодно встречается у 1 пациента с эпилепсией из 1000. У некоторых пациентов риск выше, что может быть связано с сопутствующей патологией. Чтобы уменьшить Ваши риски, необходимо с врачом создать совместный план по контролю над приступами.



Разговаривай об этом с семьей, друзьями, сотрудниками и преподавателями. Самый лучший путь держать себя в безопасности, это дать знать людям, как помочь если у тебя приступ. Будь смелым и начинай общаться.



Если у тебя депрессия, обсуди с доктором. Симптомы депрессии:
- Жизнь кажется постоянной борьбой
- Тебе кажется, что все что ты делаешь - неправильно
- Вещи или события, которые раньше были в радость, не приносят удовольствия