

Обратные тригонометрические функции



Теоретическая часть



По ссылке

<https://www.youtube.com/watch?v=9Rpn2THXFzU>

просмотреть видеоурок

Обратные тригонометрические функции

$$y = \arcsin x$$




Рис. 15

$$y = \arccos x$$




Рис. 16

$$y = \arctg x$$




Рис. 17

$$y = \operatorname{arccotg} x$$





Рис. 18

ОБРАТНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

ФУНКЦИЯ $y = \arcsin x$


Определение. $y = \arcsin x$ (читают: арксинус x) – это функция, обратная к функции $y = \sin x$. График функции $y = \arcsin x$ может быть получен из графика функции $y = \sin x$, $x \in [-\pi/2; \pi/2]$ с помощью преобразования симметрии относительно прямой $y = x$.



[В оглавление](#)

Свойства функции $y = \arcsin x$


- 1) Область определения: отрезок $[-1; 1]$;
- 2) Область изменения: отрезок $[-\pi/2, \pi/2]$;
- 3) Функция $y = \arcsin x$ нечетная:
 $\arcsin(-x) = -\arcsin x$;
- 4) Функция $y = \arcsin x$ монотонно возрастающая;
- 5) График пересекает оси Ox , Oy в начале координат.



ОБРАТНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

ФУНКЦИЯ $y = \arccos x$

Определение. $y = \arccos x$ (читают: арккосинус x) – это функция, обратная к функции $y = \cos x$, $x \in [0; \pi]$. График функции $y = \arccos x$ может быть получен из графика функции $y = \cos x$, $x \in [0; \pi]$ с помощью преобразования симметрии относительно прямой $y = x$.



Свойства функции $y = \arccos x$.

Функция $y = \arccos x$ является строго убывающей

$$\cos(\arccos x) = x \text{ при}$$


$$-1 \leq x \leq 1$$

$$\arccos(\cos y) = y \text{ при}$$

$$0 \leq y \leq \pi$$

$$D(\arccos x) = [-1; 1]$$


$$E(\arccos x) = [0; \pi]$$



ОБРАТНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ


ФУНКЦИЯ $y = \text{ARCTG } x$

Определение. $y = \text{arctg } x$ (читают: арктангенс x) – это функция, обратная к функции $y = \text{tg } x$, $x \in (-\pi/2; \pi/2)$. График функции $y = \text{arctg } x$ может быть получен из графика функции $y = \text{tg } x$, $x \in (-\pi/2; \pi/2)$, с помощью преобразования симметрии относительно прямой $y = x$.



$y = \operatorname{arctg} x$


- 1) Область определения: \mathbb{R}
- 2) Область значения: отрезок $[-\pi/2, \pi/2]$;
- 3) Функция $y = \operatorname{arctg} x$ нечетная: $\operatorname{arctg} (-x) = -\operatorname{arctg} x$;
- 4) Функция $y = \operatorname{arctg} x$ монотонно возрастающая;
- 5) График пересекает оси Ox , Oy в начале координат.



ОБРАТНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

ФУНКЦИЯ $Y = \text{ARCCTG } X$

Определение. $y = \text{arcctg } x$ (читают: арккотангенс x) – это функция, обратная к функции $y = \text{ctg } x$, $x \in (0; \pi)$. График функции $y = \text{arcctg } x$ может быть получен из графика функции $y = \text{ctg } x$, $x \in (0; \pi)$, с помощью преобразования симметрии относительно прямой $y = x$.



[В оглавление](#)

1) Область определения: \mathbb{R}

2) Область значения: отрезок


$[0; \pi]$;

$\operatorname{arccotg} x$

3) Функция $y = \operatorname{arccotg} x$ нечетная:

$\operatorname{arccotg} (-x) = - \operatorname{arccotg} x$;

4) Функция $y = \operatorname{arccotg} x$ монотонно убывающая;



Основные свойства обратных тригонометрических функций

$$\arcsin(-x) = -\arcsin x$$

$$\operatorname{arctg}(-x) = -\operatorname{arctg}x$$

$$\arccos(-x) = \pi - \arccos x$$

$$\operatorname{arcctg}(-x) = \pi - \operatorname{arcctg}x$$

$$\arcsin x + \arccos x = \pi/2$$

$$\operatorname{arctg}x + \operatorname{arcctg}x = \pi/2$$

$$\arcsin(\sin x) = x, \quad x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right];$$

$$\sin(\arcsin x) = x, \quad x \in [-1; 1].$$

$$\operatorname{arctg}(\operatorname{tg} x) = x, \quad x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right);$$

$$\operatorname{tg}(\operatorname{arctg} x) = x.$$

$$\arccos(\cos x) = x, \quad x \in [0; \pi];$$

$$\cos(\arccos x) = x, \quad x \in [-1; 1].$$

$$\operatorname{arcctg}(\operatorname{ctg} x) = x, \quad x \in (0; \pi);$$

$$\operatorname{ctg}(\operatorname{arcctg} x) = x.$$

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}, \quad x \in [-1; 1].$$

$$\operatorname{arctg} x + \operatorname{arcctg} x = \frac{\pi}{2}.$$

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
α°	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	210°	225°	240°	270°	300°	315°	330°	360°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	-	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	-	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	0
$\operatorname{ctg} \alpha$	-	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	-1	$-\sqrt{3}$	-	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	-1	$-\sqrt{3}$	-

Примеры вычислений

• 1) $\arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}$, так как $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ и $\frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$;

• 2) $\arcsin 0 = 0$, так как $\sin 0 = 0$ и $0 \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$;

• 3) $\arcsin \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{\pi}{4}$, так как

$\sin \left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ и $-\frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

Примеры вычислений

- 1) $\arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$, т. к. $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, $\frac{\pi}{3} \in [0; \pi]$;
- 2) $\arccos 1 = 0$, т. к. $\cos 0 = 1$, $0 \in [0; \pi]$;
- 3) $\arccos \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}$, т. к. $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$, $\frac{2\pi}{3} \in [0; \pi]$;
- 4) $\arccos \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{3\pi}{4}$, т. к. $\cos \frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{3\pi}{4} \in [0; \pi]$.

Примеры вычислений

- 1) $\operatorname{arccctg} \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$, т.к. $\operatorname{tg} \frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ и $\frac{\pi}{6} \in (0; \pi)$;
- 2) $\operatorname{arccctg}(-\sqrt{3}) = \pi - \operatorname{arccctg} \sqrt{3} = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$.

$$\operatorname{arctg}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\pi/6$$

$$\operatorname{arctg}\sqrt{3} = \pi/3$$

$$\operatorname{arcctg}\sqrt{3} = \pi/6$$

$$\operatorname{arctg}(-\sqrt{3}) = -\pi/3$$

$$\operatorname{arcctg}(-\sqrt{3}) = 5\pi/6$$

$$\operatorname{arcctg}(-1) = 3\pi/4$$

$$\operatorname{arctg}1 = \pi/4$$

$$\operatorname{arcctg}1 = \pi/4$$

$$\operatorname{arctg}\frac{1}{\sqrt{3}} = \pi/6$$

$$\operatorname{arctg}(-1) = -\pi/4$$

Пример:

Вычислить

$$\operatorname{arctg} \left(-\frac{\sqrt{3}}{3} \right) + \operatorname{arcctg} \sqrt{3} + \operatorname{arcctg} 0 + \operatorname{arctg} (-2) + \operatorname{arctg} 2.$$

Решение:

$$\operatorname{arctg} \left(-\frac{\sqrt{3}}{3} \right) = -\frac{\pi}{6}$$

$$\operatorname{arcctg} \sqrt{3} = \frac{\pi}{6}$$

$$\operatorname{arcctg} 0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\operatorname{arctg} (-2) = -\operatorname{arctg} 2$$

$$-\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} 2 + \operatorname{arctg} 2 = \frac{\pi}{2}$$

Ответ: $\frac{\pi}{2}$.

a) $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) + \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right);$

б) $\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \arcsin(-1);$

в) $\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right);$

г) $\arccos\frac{\sqrt{2}}{2} - \arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$

Практическая часть

<https://yadi.sk/i/e58CznUDHNTfeg>

По ссылке посмотреть мои видеокomментарии



«Обратные тригонометрические функции»

Вычислить:

$$1) \arccos \frac{\sqrt{3}}{2} =$$

$$2) \arcsin(-1) =$$

$$3) \operatorname{arctg} 1 =$$

$$4) \arccos\left(-\frac{1}{2}\right) =$$

$$5) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) =$$

$$6) \operatorname{arcctg} \frac{\sqrt{3}}{3} =$$

$$7) \arccos(-1) =$$

$$8) \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} =$$

$$9) \operatorname{arctg}(-\sqrt{3}) =$$

$$10) \operatorname{arcctg} 0 =$$

$$11) \arcsin(-1,3) =$$

$$12) \operatorname{arcctg}(-1) =$$

$$13) \arccos 5 =$$

$$14) \operatorname{arctg} 0 =$$

Вычислите значение выражения.

1. $\arcsin 0$

2. $\arccos 1$

3. $\arcsin \frac{\sqrt{2}}{2}$

4. $\arccos 3$

5. $\arcsin (-1)$

6. $\arccos \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$

7. $\operatorname{arctg} 0$

8. $\operatorname{arcctg} 1$

9. $\operatorname{arctg} (-\sqrt{3})$

10. $\operatorname{arcctg} \left(-\frac{\sqrt{3}}{3} \right)$

11. $\arcsin \left(-\frac{1}{2} \right) + \arccos 1$

12. $\arcsin -\frac{1}{2} + \arccos 1$

13. $\cos (\arccos 1)$

14. $\sin \left(\arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$

15. $\arcsin \left(\sin \frac{\pi}{4} \right)$

16. $\arccos \left(\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right)$

17. $\cos \left(\arcsin \left(-\frac{1}{3} \right) \right)$

18. $\operatorname{tg} \left(\arccos \left(-\frac{1}{4} \right) \right)$

19. $\sin (\operatorname{arcctg}(-2))$

20. $\arcsin \left(\cos \frac{\pi}{9} \right)$

1. Вычислите:

1) $\arcsin 1$; 2) $\arccos \frac{\sqrt{3}}{2}$; 3) $\arcsin \frac{\sqrt{2}}{2}$; 4) $\arccos \frac{1}{2}$;

5) $\arcsin 0$; 6) $\arccos (-1)$; 7) $\arcsin \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$; 8) $\arccos \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$;

9) $\arcsin \left(-\frac{1}{2}\right)$; 10) $\operatorname{arctg} \sqrt{3}$; 11) $\operatorname{arctg} 1$; 12) $\operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{3}}$;

13) $\operatorname{arctg} 0$; 14) $\operatorname{arctg}(-1)$; 15) $\operatorname{arctg}(-\sqrt{3})$.

2. Найдите значение выражения:

1) $\operatorname{arctg} 1 - \operatorname{arctg} (-1)$; 2) $\arcsin \left(-\frac{1}{2}\right) - \operatorname{arctg} \sqrt{3}$;

3) $\arcsin 1 - 2\arccos \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$; 4) $-\arcsin (-1) - \frac{1}{\pi} \arccos \frac{\sqrt{2}}{2}$.

a) $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) + \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right);$

б) $\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \arcsin(-1);$

в) $\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right);$

г) $\arccos\frac{\sqrt{2}}{2} - \arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$

Вычислите:

a) $\operatorname{arccotg}(-1) + \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}}{3} - \operatorname{arccotg} 0;$

Вычислите:

a) $\operatorname{arccotg} \sqrt{3} - \operatorname{arctg} 1 + \operatorname{arccotg}(-\sqrt{3});$