


Обитатели тайги



Еж обыкновенный

Русское название –

Обыкновенный, или европейский ёж

Латинское название – Erinaceus europaeus

Класс – Млекопитающие (Mammalia)

Отряд – Насекомоядные (Insectivora)

Семейство – Ежовые (Erinaceidae)

Род – Евразийские ежи (Erinaceus)




Еж обыкновенный

Обыкновенный ёж, или европейский ёж (*Erinaceus europaeus*), вид млекопитающих из рода евразийских ежей семейства ежовых.




Обыкновенный ёж населяет самые разнообразные места обитания: опушки, перелески, небольшие поляны, поймы рек, в открытых лесах, травянистых равнинах, в кустарниках, песчаной местности и даже в парках.

Обыкновенный ёж



Иглы у ежа короткие, не более 3 см. На голове иглы разделены на 2 части «пробором». На спине, боках и голове иглы достигают в длину 2 см. Внутри они полые, наполненные воздухом.. У взрослых ежей обычно по 5—6 тысяч игл, у более молодых особей около 3 тысяч.

Обыкновенный ёж



Поверхность игл гладкая, окраска слагается из буроватых и светлых поясков.

На лапах по 5 пальцев с острыми когтями. Задние ноги более длинные, чем передние.

Ёж животное небольших размеров. Длина его тела составляет до 30 см, хвоста — около 3 см, весит - до 800 г. Уши небольшие - 3,5 см. Морда вытянутая. Нос у ежа острый и влажный.



Обыкновенный ёж

Ёж активен в ночное время суток. День ежи проводят в гнезде или других укрытиях.

Гнёзда строят в кустах, ямах, пещерах, заброшенных норах грызунов.

В гнезде подстилка из сухой травы или листьев, мха.

При помощи длинных средних пальцев на ногах ежи ухаживают за своими колючками.



Самцы агрессивны друг к другу, ревностно охраняют свои участки. Линька у обыкновенных ежей обычно весной или осенью. В природе эти животные живут до 5 лет, в неволе могут доживать до 10 лет.

Обыкновенные ежи

Ежи могут бегать со скоростью до 3 метров в секунду, хорошо умеют плавать и прыгать. При ходьбе и беге ежи ступают на землю всей ступнёй.



У ежа плохое зрение, но острое обоняние и слух. В летнее время частота пульса составляет 180 сокращений в минуту, в зимнюю спячку частота снижается до 20 ударов в минуту, при этом ежи совершают всего один вдох в минуту. С наступлением заморозков закрывают вход в нору и впадают в зимнюю спячку.

Обыкновенные ежи

Спячка длится с октября по апрель. Во время спячки температура тела ежа падает до 2°C.

За лето ежу необходимо запасти как можно больше жира не менее 500 г. После спячки ёж не выходит из гнезда, пока температура воздуха не поднимется до 15°C.

Обыкновенные ежи ведут одиночный образ жизни. Ёж это всеядное животное. Основу его питания составляют насекомые, гусеницы, слизни, иногда дождевые черви, мыши, иногда рептилии и амфибии. Из растений может поедать ягоды и фрукты.




Обыкновенный ёж





Среди поедаемых ежом насекомых есть вредные, например, майские жуки, волосатые жужелицы, гусеницы монашенки, непарные шелкопряды.

Поедают также яйца и птенцов любых мелких гнездящихся на земле.



На ежей слабо действуют такие яды, как мышьяк, сулема, опиум и даже синильная кислота. Очень большие дозы ядов губительны для ежей, но дозы, убивающие других животных, а также человека, ежам не вредят. Настоящих мышей, сколько менее шустрых полёвок, в природе ежи добывают довольно редко и в небольших количествах.



Обыкновенный ёж

После зимней спячки у ежей начинается брачный период. Между самцами часто происходят драки из-за самок. Самцы кусают друг друга за ноги, морду, толкаются, используют в бою свои иглы. Во время драки ежи громко сопят и фыркают. После битвы победитель часами кружит вокруг самки.



В качестве убежища ежиха либо роет собственную нору, либо использует брошенные норы грызунов. В норе находится подстилка из сухой травы и листьев.

Обыкновенный ёж



Ежата рождаются голыми, слепыми, с ярко-розовой кожей, масса их тела всего 12 граммов. Через несколько часов после рождения у ежат появляются белые и тёмные мягкие иглы. Полностью игловой покров формируется к 15 дню жизни. Ежиха кормит детёнышей молоком около 1 месяца. После её окончания ежата начинают жить самостоятельно. Половозрелыми становятся к году.


Как правило, за год самка приносит только один выводок. Беременность длится 49 дней. В помёте обычно от 3 до 8 детёнышей.



Обыкновенный ёж



В лесных угодьях ежи собирают на себя клещей, в том числе энцефалитных, больше, чем любые другие зверьки, поскольку его колючий покров, как щёткой, счёсывает голодных клещей с травы. От клещей, забравшихся между иглами, ёж не способен избави



Обыкновенный ёж

Ответь на вопросы:

- Есть ли у ежа хвост?
- Сколько иголок на теле у взрослого ежа?
- Чем питается ёж?
- Собирает ли ёж грибы и яблоки на свои иголки?
- Как иначе называют ежа обыкновенного?
- Что собирает на себя ёж на влажных лугах в начале лета?
- Может ли ёж бегать, плавать и прыгать?
- Что и сколько этого должен запасти ёж, чтобы благополучно пережить спячку?
- Какими на свет появляются ежата?
- Верно ли, что на ежа не действуют сильные яды?
- Когда еж впадает в зимнюю спячку?