


Тип Arthropoda

Н/класс Crustacea





2 пары антенн (у трилобитов 1)


3 пары конечностей участвующих в обработке пищи

Класс Branchiopoda (Жаброногие)

Кембрий?, девон-ныне

















КОНХОСТРАКИ

Раковинные листоногие







Класс Ostracoda (ракушковые рачки)



Internal view of valve




Internal view of body



Exterior view


Morphology of an ostracode

Кембрий-ныне



Figs. 2-6. *Aurila ornellasae* sp. nov.: 2, holotype ♀, LV (MP-O 1756); 3, paratype ♀, RV (MP-O 1755); 4, paratype ♀, C, dorsal view (MP-O 1757); 5, paratype ♂, C, dorsal view (MP-O 1758); 6, paratype, juvenile, RV (MP-O 1759). Scales, 200 μm.

Класс Cirripedia (усоногие рачки)



Силур-ныне



Класс Malacostraca (мягкоракovinные)



Кембрий-ныне

Decapoda

10 ног, головогрудь




Пермь-ныне







Π/μνη Chelicerata



Класс Xiphosura (Мечехвосты)




Пермь-ныне







Класс Eurypterida (ракоскорпионы)






Ордовик-пермь





Eurypterus
Sea scorpion







КЕМБРИЙ





кембрий




Anomalocaris








Anomalocaris canadensis
Burgess Shale, Canada



Laggania cambria
Burgess Shale, Canada



Anomalocaris saron
Chengjiang, China



Amplectobelua symbrachiata
Chengjiang, China



