

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Департамента здравоохранения города Москвы

«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 2»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по МДК. 02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях

ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах

«Особенности сестринского ухода за пациентками с послеродовыми осложнениями»

Специальность 34.02.01 Сестринское дело

Выполнила: студентка группы № 4171

Багданова Лилия Фаилевна

Руководитель: **Шалаева Мария Арслановна,**

преподаватель ГБПОУ ДЗМ «МК №2»

Москва

Актуальность



Процентное содержание по заболеваниям

Послеродовой период

начинается сразу после окончания родов и продолжается 6-8 недель. Выделяют *ранний послеродовой период* - это первые 2 часа после родов, это время роженица находится в родильном блоке. В течение первых 2 часов после окончания родов наступает гемостаз в матке. После этого женщина переводится в послеродовую палату.

Гнойно-септические заболевания

- Предрасполагающие Факторы для гнойно-септических заболеваний в послеродовом периоде:
- длительное течение родов,
 - длительный безводный период,
 - многократные вагинальные исследования,
 - внутриматочные манипуляции (ручное отделение плаценты и выделение
 - последа),
 - геморрагическая анемия,
 - травмы родовых путей,
 - очаги хронической инфекции (пиелонефрит, кольпит и др.),
 - нарушение правил асептики и антисептики.

Послеродовые язвы



Послеродовые язвы - это инфицированные раны на промежности, стенке влагалища, в шейке матки, в области наложения швов. Больные с послеродовыми язвами подлежат переводу во 2-е акушерское отделение. Возникает на 3-4 сутки после родов. Наблюдаются местные изменения в виде отложения гнойно-некротического налета, отека и гиперемии окружающих тканей, общее состояние роженицы не нарушается.

Послеродовый эндометрит



Послеродовый эндометрит чаще протекает в легкой форме, проявляется субинволюцией матки, гнойно-кровянистыми выделениями из матки. Температура тела повышается до $38,0-38,5^{\circ}\text{C}$, в крови умеренный лейкоцитоз и сдвиг лейкоцитарной формулы влево.

Проблемы пациента

Жалобы на слабость, нарушения сна, аппетита, головные боли. Температура тела выше $39,0^{\circ}\text{C}$, лейкоцитоз крови выше $14,0 \times 10^9/\text{л}$, анемия.

Эндометрит после кесарева сечения часто сопровождается парезом кишечника, возникает опасность несостоятельности швов на матке с развитием перитонита

Лечение эндометрита после родов



Для уменьшения всасывания продуктов распада, токсинов полость матки промывают растворами антисептиков или антибиотиков. Для усиления сократительной способности миометрия назначают утеротонические средства.

Проводят терапию антибактериальную, инфузионную, детоксикационную.

Заключение

Роль медицинской сестры в профилактике осложнений послеродового периода сложно переоценить, но на каждом этапе становления женщины как матери она существенно различается. На этапе женской консультации беременная женщина хочет получать от акушерки как можно больше информации, таким образом акушерка женской консультации - это главный информатор