Дислалия

Выполнили: студенты 1 курса группы Б – 8111 Аверкович Арина, Шефер Арина, Чепель Валерия

Дислалия – это патология, которая связана с неправильным воспроизведением звуков, при наличии нормального слуха и иннервации артикуляционного аппарата.

Дислалия является наиболее распространенным в логопедии речевым нарушением, которое встречается у 25-30% (по некоторым данным – 52,5%) дошкольников (5-6 лет), 17-20% младших школьников (1-2 класс) и у 1% детей более старшего возраста.





Классификация

- В зависимости от тяжести протекания болезни дислалия делится на:
- простую характеризуется неправильным произношением только одной группы звуков, например, шипящих или свистящих;
- сложную дислалию отличается тем, что дефектно воспроизводится более двух групп звуков. В таких случаях говорят о полиморфной дислалии.

Симптоматика



Лечение дислалии у детей

В случае диагностированной механического вида дислалии необходимо устранить причину такой патологии. Детям проводятся пластика уздечки языка, ортодонтическое лечение в стоматологической клинике. Логопеды проводят коррекционные мероприятия. Специалист постоянно отрабатывает полноценное произношение опорных звуков, развивает с пациентом мелкую моторику.

 Важно: занятия по коррекции дислалии должны проводиться не менее 3 раз в неделю под контролем врача логопеда. В домашних условиях рекомендованные занятия нужно проводить ежедневно. Продолжительность коррекционного курса составляет срок до 3 месяцев при простой форме заболевания и до полугода при сложной дислалии.

Спасибо за внимание!