

Дислалия

Выполнили: студенты 1 курса группы Б – 8111
Аверкович Арина, Шефер Арина, Чепель Валерия

Дислалия – это патология, которая связана с неправильным воспроизведением звуков, при наличии нормального слуха и иннервации артикуляционного аппарата.

Дислалия является наиболее распространенным в логопедии речевым нарушением, которое встречается у 25-30% (по некоторым данным – 52,5%) дошкольников (5-6 лет), 17-20% младших школьников (1-2 класс) и у 1% детей более старшего возраста.



Дислалия

```
graph TD; A[Дислалия] --> B[Функциональная]; A --> C[Механическая]; B --> D[Акустико-фонематическая]; D --> E[Артикуляторно-фонематическая]; E --> F[Артикуляторно-фонетическая]; C --> G[Сенсорная]; G --> H[Моторная];
```

Функциональная

Акустико-фонематическая

Артикуляторно-фонематическая

Артикуляторно-фонетическая

Механическая

Сенсорная

Моторная

Классификация

В зависимости от тяжести протекания болезни дислалия делится на:

- простую – характеризуется неправильным произношением только одной группы звуков, например, шипящих или свистящих;
- сложную дислалию – отличается тем, что дефектно воспроизводится более двух групп звуков. В таких случаях говорят о полиморфной дислалии.

Симптоматика

Виды нарушений звука

```
graph TD; A[Виды нарушений звука] -.-> B[Замена звука]; A -.-> C[Смещения звука]; A -.-> D[Искажения звука];
```

Замена звука

Смещения звука

Искажения звука

Лечение дислалии у детей

В случае диагностированной механического вида дислалии необходимо устранить причину такой патологии. Детям проводятся пластика уздечки языка, ортодонтическое лечение в стоматологической клинике. Логопеды проводят коррекционные мероприятия. Специалист постоянно отрабатывает полноценное произношение опорных звуков, развивает с пациентом мелкую моторику.

- Важно: занятия по коррекции дислалии должны проводиться не менее 3 раз в неделю под контролем врача логопеда. В домашних условиях рекомендованные занятия нужно проводить ежедневно. Продолжительность коррекционного курса составляет срок до 3 месяцев при простой форме заболевания и до полугода при сложной дислалии.

**Спасибо за
внимание!**