

Реанимация у детей до года. Восстановление проходимости дыхательных путей.



Сохранять положение головы,
показанное на фото.
Избегать чрезмерного
запрокидывания
головы!



Искусственное дыхание.



- Герметично обхватить губами рот и нос ребёнка;
- осуществить небольшой выдох, достаточный для подъёма передней грудной стенки;
- контролировать подъем грудной клетки;
- освободить рот и нос ребёнка, контролировать пассивный выдох.

Соотношение дыхания и массажа:

2 спасателя - 2:30

1 спасатель - 2:30

Непрямой массаж сердца.



- У детей в возрасте до года закрытый массаж выполняется кончиками указательного и среднего пальцев со скоростью не менее
- 120 надавливаний в минуту;
- прогиб грудной клетки 1,5-2 см.;
- точка компрессий – на линии, соединяющей
- соски ребенка.

Реанимация у детей от 1 года до 8 лет.

Восстановление проходимости дыхательных путей.



Проводиться так же как и взрослым - запрокидывание головы с одновременным выдвижением подбородка .

Непрямой массаж сердца.



- Точка проведения массажа сердца на 1 палец выше мечевидного отростка грудины.
- Массаж проводится основанием ладони одной руки на глубину 2,5-4 см.
- В темпе 100 раз в минуту.
- Соотношение дыхания и массажа равно 30:2



Реанимацию можно прекратить:

- Если прощупывается самостоятельный пульс на сонной артерии, а грудная клетка поднимается и опускается, то есть пострадавший дышит сам.
- Если реанимационные мероприятия берёт на себя бригада скорой помощи.
- Если врач отдал приказ о её прекращении ввиду неэффективности (констатировал смерть).
- При неэффективности реанимационных мероприятий в течении 30 минут

Исключением является утопление в ледяной воде или смерть от замерзания,

которые произошли на ваших глазах.

При этом клиническая смерть удлиняется (от 15 минут до часа) и реанимация

Может продолжаться более 30 минут

Обструкция верхних дыхательных путей. (угрожающее жизни состояние).



Это попадание инородного предмета в дыхательные пути, препятствующие дыханию и способные вызвать смерть от


удушья.

Самая частая причина возникновения

у

взрослых является прием пищи из рыбы,

мяса, птицы.



1 - нормальный путь
прохождения пищи;
2 - пища, попавшая в трахею
с воздухом

Порядок действий.

1. Если у пострадавшего наблюдаются признаки частичной обструкции дыхательных путей (дышит и может говорить). Значит у него ещё проходимы дыхательные пути.

- побуждайте его продолжать кашлять.

2. Если у пострадавшего признаки полной обструкции и он находится в сознании.

- Проведите серию ударов по спине.





Первая помощь.

Удаление инородного тела из верхних
Дыхательных путей при помощи
Приёма **Геймлиха**



- встать позади пострадавшего;
- обхватить живот обеими руками;
- сожмите кулак одной руки и поместите его между пупком и грудиной ;
- резко потянуть кулак на себя и вверх.

Если обструкция всё ещё не исчезла, продолжать:

5 ударов по спине с пятью толчками в живот.

Алгоритм ПМП по удалению инородного тела из верхних дыхательных путей младенца.



- Поднять одной рукой за ножки младенца;
- Основанием другой кисти нанести 2-3 несильных удара по межлопаточной области;
- В последующем провести пальцевое исследование ротовой полости, удалить остатки жидкости, слизь.