

# **Стриктурь желчевыводящих путей.**

## Причины:

- травматические;
- воспалительные;
- опухолевые.

## Классификация:

В зависимости от локализации выделяют следующие виды заболевания:

- долевые;
- общий печеночный;
- общий желчевыводящий проток.


**По тяжести и степени проходимости течения болезни выделяют:**

- полная стриктура;
- частичная стриктура.

**Согласно другой классификации данное заболевание бывает:**

- ятрогенным – механическая причина развития;
- опухолевые;
- травматические – образуются вследствие интраоперационных повреждений желчевыводящих путей, которые возникают при проведении холецистэктомии.

# Тип стриктуры



# Симптомы:

\*

развивается боль с правой стороны живота;

\* боль постоянна и тупа;

\* дискомфорт и ощущение тяжести в животе;

\* повышенная температура тела;

\* желтуха;

\* лихорадка;

\* общая слабость;

\* головокружение;

\* истечение желчи;

\* рвота, тошнота, метеоризм, анорексия;

\* кишечная непроходимость (иногда);

\* желчный перитонит;

\* возможно развитие подпеченочного абсцесса;

\* обесцвечивание кала;

\* моча становится темной;

\* развивается зуд кожи.

## Осложнения:

/билиарный вторичный цирроз печени

/гипертензия портальная

/сепсис

/абсцессы в брюшной полости

/кишечные и желудочные кровотечения

/печеночная недостаточность

/внутренние и внешние желчные свищи


/гепатит

## Диагностика:

- +биохимический анализ крови;
- +биохимические пробы печени (не уровень трансаминаз, билирубина и активности щелочной фосфатазы);
- +ультразвуковое исследование;
- +сцинтиграфия гепатобилиарной системы;
- +магнитно-резонансная томография;
- +чрескожная и чреспеченочная холангиографии;
- +дуоденография релаксационная;
- +холангиопанкреатография ретроградная;
- +магнитно-резонансная панкреатохолангиография;









**Рис. 20.1.** Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатикография.

А — стеноз общего желчного протока; в проксимальной части он резко расширен (белая стрелка), в средней части сужен (черная стрелка); Б — после 3 мес. противотуберкулезной терапии [13]



**Рис. 20.3.** Холангиография. Стриктура терминального отдела общего желчного протока (2); внутри- и внепеченочные желчные протоки диффузно расширены, в терминальном отделе холедоха одиночный конкремент (1); желчный пузырь удален



