



Показательные и логарифмические уравнения, системы, неравенства

Срок сдачи 6 февраля



$$a^{f(x)} > a^{g(x)} \Leftrightarrow (a-1)(f(x)-g(x)) > 0$$

$$\log_a f(x) > (<) \log_a g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > 0, \\ g(x) > 0, \\ (a-1)(f(x)-g(x)) > 0 (< 0). \end{cases}$$

$$\frac{x^2 + x - 2}{(3^x - 1)(2^{x^2} - 16)} \geq 0.$$

$(-\log_2 6; 1)$.

$$(56 - x - x^2)^{x^3 - 2x^2} \geq (56 - x - x^2)^{2x^2 + 5x}.$$

$$a(x)^{f(x)} > a(x)^{g(x)} \Leftrightarrow \begin{cases} a(x) > 0, \\ (a(x) - 1)(f(x) - g(x)) > 0. \end{cases}$$

$$\left(-8; \frac{-1 - \sqrt{221}}{2}\right] \cup [-1; 0] \cup \left[5; \frac{-1 + \sqrt{221}}{2}\right].$$

$$\frac{\lg(3x^2 - 3x + 7) - \lg(6 + x - x^2)}{(10x - 7)(10x - 3)} \geq 0.$$

$$\left(-2; \frac{3}{10}\right) \cup \left\{\frac{1}{2}\right\} \cup \left(\frac{7}{10}; 3\right).$$

$$\log_{x^2-3}(4x+7) > 0.$$

$$\log_{a(x)} f(x) < \log_{a(x)} g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} a(x) > 0, \\ f(x) > 0, \\ g(x) > 0, \\ (a(x)-1)(f(x)-g(x)) < 0. \end{cases}$$

$$\left(-\frac{7}{4}; -\sqrt{3}\right) \cup (2; +\infty).$$

Пример 17. (МГУ, 1973, биофак) Найти все значения параметра a , для каждого из которых неравенство $4^x - a \cdot 2^x - a + 3 \leq 0$ имеет хотя бы одно решение.

$[2; +\infty)$.

C2. Найдите все значения параметра a , при которых уравнение $\log_{\cos x - a}(\sin 2x - \sqrt{3} \cos 2x + \sqrt{3} \sin x + \cos x + \sqrt{3} + 1) = 0$ не имеет корней.

Ответ: $\left\{\frac{\sqrt{3}}{2} - 1\right\} \cup \left[\frac{\sqrt{3}}{2}; +\infty\right)$.

C5. Найдите все значения параметра a , при которых система

уравнений
$$\begin{cases} 2 \cdot 1000^x + 16 - a^2 - 2a = (2a + 9)(y - 1)^2 - 2ay, \\ (x^2 + 1)\lg(y - 1) = x^3 + x \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения

Ответ: $a \in (-4; -2) \cup (-2; 4] \cup \left\{ \frac{33}{8} \right\}$.