




ВИЧ-инфекция


ВИЧ-инфекция

- ВИЧ-инфекция - болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека -инфекционное хроническое заболевание, характеризующееся специфическим поражением иммунной системы, приводящим к медленному ее разрушению до формирования синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД).



СПИД

СПИД - состояние, развивающееся на фоне ВИЧ-инфекции и характеризующееся появлением одного или нескольких заболеваний, отнесенных к СПИД-индикаторным.



Этапы развития эпидемии

- Первый зарегистрированный случай смерти от СПИДа - в 1959 году в Конго умер мужчина.
- В 1978 году у гомосексуальных мужчин в Соединенных Штатах Америки и Швеции и гетеросексуалов в Танзании начали проявляться признаки того, что позже будет названо СПИДом



Этапы развития эпидемии

Еженедельный отчет Центра по контролю и профилактике заболеваний о заболеваемости и смертности

Пневмоцистная пневмония диагностирована у пяти ранее здоровых молодых мужчин в Лос-Анджелесе – 5 июня 1981 г.

FIGURE. MMWR report on *Pneumocystis pneumonia* in five previously healthy young men in Los Angeles — June 5, 1981

CDC
CENTERS FOR DISEASE CONTROL
AND PREVENTION

MMWR™
MORBIDITY AND MORTALITY
WEEKLY REPORT

June 5, 1981 / Vol. 30 / No. 21

249 Dengue Type 4 Infections in U.S.
Travelers to the Caribbean
250 Pneumocystis Pneumonia —
Los Angeles
252 Measles — United States, Five
Weeks
253 Risk-Factor-Prevalence Survey
259 Surveillance of Childhood Le
Poisoning — United States
261 Quarantine Measures

Pneumocystis Pneumonia — Los Angeles

In the period October 1980–May 1981, 5 young men, all active homosexual men, were treated for *Pneumocystis carinii*-confirmed pneumonia at three different hospitals in Los Angeles. All five patients had lab evidence of *P. carinii* infection and candidal infection. One patient died.

Пневмоцистная пневмония — Лос-Анджелес

В период с октября 1980 по май 1981 г. 5 молодых мужчин, все активные гомосексуалисты, лечились в трех различных госпиталях Лос-Анджелеса, Калифорния, по поводу подтвержденной биопсией пневмонии, вызванной *Pneumocystis carinii*. Двое пациентов умерли. Все пять страдали выявленными ранее цитомегаловирусной инфекцией (ЦМВ) и кандидозом. Приводим выдержки из истории болезни.

Пациент 1: В марте 1981 г. ранее здоровый мужчина 33 лет поступил в стационар по поводу обусловленной *P. carinii* пневмонии и кандидоза слизистых полости рта, развившихся на фоне 2 месяцев лихорадки, повышения печеночных ферментов, лейкопении и обнаружения ЦМВ в моче. Несмотря на лечение триметоприм-сульфаметаксазолом, ...и ацикловиром, 3 мая больной умер. На вскрытии подтверждена пневмоцистная пневмония, но данных за неоплазию не обнаружено.

Этапы развития эпидемии



- В 1981 году Майкл Готлиб обнаружил в крови инфекцию, убивающую клетки иммунной системы.

В 1982 году среди ученых появилось название – синдром приобретенного иммунодефицита.

Этапы развития эпидемии




- Вирус иммунодефицита человека был выделен в 1983 году в двух лабораториях: в Институте Пастера во Франции Люком Монтанье и в Национальном институте рака в США Робертом Галло.

Этапы развития эпидемии

- ВИЧ-инфекция в России - с 1986 года;
- первая тысяча ВИЧ-положительных зарегистрирована - с 1987 по 1995 год;
- в 1989 году заразили в больницах Элисты и Волгограда более 200 детей.



Этапы развития эпидемии




- В 1985 г. азидотимидин становится первым препаратом, применяемым для борьбы с ВИЧ.
- В 1996 году стали использовать АРВТ из трех препаратов, влияющих на разные стадии развития вируса.

Иммунная система

T-лимфоциты

B-клетки

КЛЕТКИ-УБИЙЦЫ ФАГОЦИТЫ




T-лимфоциты первыми замечают чужеродное вещество (вирус или бактерию)

По их команде В-клетки вырабатывают антитела

Фагоциты уничтожают вирусы в ответ на выработку антител

Жизненный цикл ВИЧ



Как ВИЧ передается



В опасных для
заражения
количествах ВИЧ
находится:

- в крови
- сперме
- вагинальном
секрете
- грудном молоке




Как ВИЧ передается

Половой путь



Как ВИЧ передается

Вертикальный путь




Как ВИЧ передается

Парентеральный путь











Как обнаружить ВИЧ в организме



- Через 3 месяца после опасного контакта сдать кровь на обнаружение антител к ВИЧ.
- Информация о результате обследования на ВИЧ-инфекцию – строго конфиденциальна.

Как ВИЧ не передается



Устойчивость вируса во внешней среде

- Погибает под воздействием дез.веществ.
- Практически полностью уничтожается прогреванием при температуре 57° С в течение 30 минут.
- Погибает при кипячении - через 1-3 мин.
- Вирусная активность исчезает при высушивании клеточных культур при температуре 23-27°С через 3-7 дней.
- ВИЧ устойчив к ультрафиолетовым лучам и ионизирующей радиации.
- В крови, предназначеннай для переливания, вирус переживает годы, в замороженной сперме сохраняется несколько месяцев.

Стадии ВИЧ-инфекции

- Стадия инкубации (2-3 недели - 3-8 месяцев)
- Стадия первичных проявлений (один год)
- Латентная стадия (5 - 7 лет)
- Стадия вторичных заболеваний (10 лет и больше)
- Терминальная стадия





Лечение ВИЧ-инфекции

ПОДАВЛЕНИЕ РАЗМНОЖЕНИЯ ВИРУСА

СНИЖЕНИЕ ВИРУСНОЙ НАГРУЗКИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИМУННОЙ СИСТЕМЫ

ПОВЫШЕНИЕ ЧИСЛА Т-ЛИМФОЦИТОВ



Высокоактивная
антиретровирусная терапия
состоит из комбинации
нескольких препаратов и с
большей вероятностью не
дает вирусу размножаться



ВИЧ-инфекция на Земном шаре




Во всем мире живут
37 миллионов
ВИЧ-положительных
и 37 миллионов уже
умерли.
В России
зарегистрировано
998 тысяч
ВИЧ-позитивных.
308 тысяч умерли от
ВИЧ-инфекции.

ВИЧ-инфекция в Марий Эл

На диспансерном учете в ГБУ РМЭ «РЦПБ СПИД и ИЗ» стоит 1271 ВИЧ-положительный, из них 14 детей.

Умерли от различных причин — 462 человека, от СПИДа — 116 человек.

40% от всех диспансерных проживают в г. Волжске.



Среднестатистический портрет ВИЧ-положительного жителя Республики Марий Эл

Мужчина




- 30 лет
- Безработный
- Не женат
- В прошлом употреблял наркотики
- Практиковал незащищенные сексуальные контакты
- Инфицировался ВИЧ несколько лет назад при употреблении наркотиков

Женщина



- 24 года
- Безработная
- Не замужем
- Имеет ребенка
- Наркотики не употребляла
- Инфицировалась ВИЧ 3 года назад от постоянного полового партнера
- О своем диагнозе узнала в женской консультации
- Ребенок снят с учета в СПИД-центре, здоров

Итоги





Спасибо за внимание