



Улар кавказский



Презентация по кубановедению
Ученицы 7 класса
Костроминой Софьи

Описание



Кавказский улар по поименованию напоминает домашнюю курицу, но по размерам отличается в зависимости от времени года от 1,6 до 2,5 кг. Оперение у кавказского улара плотное, шея короткая, голова маленькая, клюв небольшой, но плотный и широкий, ноги короткие и толстые, крылья тоже короткие, несколько заострённые, хвост относительно длинный и слегка закруглён. Оперение обильное и густое; для защиты птицы от низких температур, свойственных высокогорным местам обитания уларов. Кавказский улар является наземной горной птицей, поэтому бегаёт легко и быстро даже по крутым склонам, пользуясь крыльями для поддержания равновесия.


Продолжение...

При опасности бежит к обрывам, чтобы спланировать в ближайшее ущелье. При полёте кавказский улар обычно громко свистит. Зимой птица довольно молчалива и сравнительно редко подаёт голос. Общая приблизительная численность кавказских уларов в течение года колеблется от 410 тысяч птиц весной (в апреле) до 700 тысяч осенью (в октябре).



Окраска этого забавного животного

Кавказский улар окрашен в серо-стальной [цвет](#) со струйчатым рисунком на каждом пере. [Горло](#), верхняя часть [зоба](#), низ и бока шеи чисто-белые, на боках туловища расположены широкие коричневые продольные полосы с чёрными окаймлениями. Передние части [спины](#), груди и часть [зоба](#) украшены чёткими поперечными полосками чёрного и светло-охристого цвета. [Перья](#) хвоста коричневато-бурые, на концах каштановые. Маховые перья белые с тёмно-бурыми концами, подхвостье снежно-белого цвета. По окраске самцы и самки не отличимы. Разница наблюдается лишь в размере и [шпорах](#).



Место обитания

Область распространения кавказского улара ограничивается альпийской зоной Главного Кавказского хребта. Здесь кавказский улар встречается от верхней границы альпийских лугов до пределов вечного снега, охватывая районы от 1800 до 4000 м над уровнем моря. Населяет крутые каменистые россыпи и скалистые ущелья с редкой и скудной высокогорной растительностью, чередующиеся с полянами, поросшими низкой альпийской травянистой растительностью. Чистых ровных склонов гор без скал и осыпей явно избегает. По ориентировочным подсчетам, в пределах всего ареала общая численность кавказских уларов колеблется в течение года от 410 тысяч птиц весной (в апреле) до 700 тысяч осенью (в октябре). Средняя плотность размещения кавказских уларов весной составляет свыше 20, осенью - около 35 особей на 1 км². Кавказский улар, как и другие его сородичи, предпринимает небольшие сезонные вертикальные кочевки. Во вторую половину лета кавказский улар поднимается к вершинам и гребням гор вслед за отступающей границей вечных снегов. Осенью с выпадением в высокогорье снегов кавказский улар спускается в более низкие пояса гор. Зиму кавказский улар проводит в основном в нижней половине альпийского пояса, а ранней весной спускается даже в верхнюю часть субальпийского пояса, где в это время появляется зелень и птицы находят достаточно пищи.

Питание

Кавказский улар является [растительноядной птицей](#). Животные [корма](#) не играют никакой роли в питании уларов. В пищу употребляют наземные части альпийских растений — [листья](#), [стебли](#), молодые [побеги](#), [бутоны](#), [цветы](#), [почки](#) и [семена](#). Всего в рационе улара около 70 видов растений. В основном это [злаки](#) и [осоки](#), [бобовые](#) и [гвоздичные](#). Кавказские улары не нуждаются в постоянных источниках воды. Её они получают вместе с растительной пищей.

