

ТЕМА:

«Профилактика пролежней»

Пролежни – это дистрофические, язвенно-некротические изменения кожи, подкожной клетчатки и других мягких тканей, развивающиеся вследствие их длительного сдавления, сдвига или трения из-за нарушения местного кровообращения и нервной трофики.



Внутренние факторы риска

обратимые

истощение
ограничение подвижности
анемия

недостаточное употребление
протеина, аскорбиновой кислоты

обезвоживание

гипотензия

недержание мочи и/или кала

неврологические расстройства (сенсорные, двигательные)

нарушение периферического кровообращения

истонченная кожа

беспокойство

спутанное сознание

кома

необратимые

старческий
возраст

Внешние факторы риска

обратимые

плохой гигиенический уход
складки на постельном и\или
нательном белье

поручни кровати

средства фиксации пациента

травмы позвоночника, костей таза,
органов брюшной полости

повреждения спинного мозга

неправильная техника перемещения пациента в кровати

применение цитостатических лекарственных средств

необратимые

обширное
хирургическое
вмешательство
продолжитель-
ностью более
двух часов

Степень риска возникновения пролежней определяется по шкале Ватерлоу:

Телосложение: масса тела относительно роста	б	Тип кожи	б	Пол, Возраст, лет	б	Особые факторы риска	б
	а		л		а		л
Среднее	0	Здоровая	0	Мужской	1	Нарушение питания	8
Выше среднего	1	Папиросная	1	Женский	2	кожи, например,	
Ожирение	2	бумага		14-49	1	терминальная	
Ниже среднего	3	Сухая	1	50-64	2	кахексия	
		Отечная	1	65-74	3	Сердечная	5
		Липкая	1	75-81	4	недостаточность	
		(повышенная температура)		более 81	5	Болезни	5
		Изменение цвета	2			периферических	
		Трешины, пятна	3			сосудов	
						Анемия	2
						Курение	1

Степень риска возникновения пролежней определяется по шкале Ватерлоу:

Недержание	Подвижность		Аппетит		Неврологические расстройства		балл
	б	а	б	а	б	а	
б а л л	Полная	0	Средний	0	например, диабет,		
контроль/ через катетер	Беспокойный, суетливый	1	Плохой	1	множественный склероз, инсульт,	4	-
Периодическое	Апатичный	2	Питатель- ный зонд/ только жидкости	2	моторные/ сенсорные, параплегия		
Через катетер/ недержание кала	Ограниченнaя подвижность	3	Не через рот/ анорексия	3			6
Кала и мочи	Инертный	4					
	Прикованный к креслу	5					

Обширное оперативное вмешательство / травма	балл	Лекарственная терапия	балл
Ортопедическое – ниже пояса, позвоночник;	5	Цитостатические препараты	4
Более 2 ч на столе	5	Высокие дозы стероидов	4
		Противовоспалительные	4

Баллы суммируются и степень риска определяется по следующим итоговым значениям:

баллы	степень риска
1-9	нет риска
10	есть риск
15	высокая степень риска
20	очень высокая степень риска

У неподвижных пациентов оценку степени риска развития пролежней следует проводить ежедневно, даже в случае, если при первичном осмотре степень риска оценивалась в 1-9 баллов.

Результаты оценки регистрируются в карте сестринского наблюдения за больным.

Места возможного образования пролежней

*в положении
на спине*


крестец
пятки
лопатки
затылок
локти


*в положении
сидя*

седалищные бугры
стопы ног
лопатки

*в положении
на боку*

область большого вертела
бедренной кости
сосцевидного отростка
височной кости





Места возможного образования пролежней


*в положении
на животе*

ребра

коленки

пальцы ног с
тыльной стороны

гребни подвздошных
костей



Клиническая картина и особенности диагностики

Клиническая картина зависит от стадии развития пролежней.

Стадия	Клиническая картина
первая	<ul style="list-style-type: none">- устойчивая гиперемия кожи, не проходящая после прекращения давления;- кожные покровы не нарушены.
вторая	<ul style="list-style-type: none">- стойкая гиперемия кожи;- отслойка эпидермиса;- поверхностное (неглубокое) нарушение целостности кожных покровов (некроз) с распространением на подкожную клетчатку.
третья	<ul style="list-style-type: none">- разрушение (некроз) кожных покровов вплоть до мышечного слоя с проникновением в мышцу;- могут быть жидкие выделения из раны.
четвертая	<ul style="list-style-type: none">- поражение (некроз) всех мягких тканей;- наличие полости, в которой видны сухожилия и/или костные образования.

Клиническая картина и особенности диагностики

Клиническая картина зависит от стадии развития пролежни.

Стадия	Клиническая картина	Изображение
первая	<ul style="list-style-type: none">- устойчивая гиперемия (краснота) в месте прекращения давления;- кожные покровы не нарушены;	
вторая	<ul style="list-style-type: none">- стойкая гиперемия кожи;- отслойка эпидермиса;- поверхностное (неглубокое) повреждение покровов (некроз) с распространением в подкожную клетчатку.	
третья	<ul style="list-style-type: none">- разрушение (некроз) кожного покрова и подлежащего слоя с проникновением инфекции в ткань;- могут быть жидкие выделения из раны.	
четвертая	<ul style="list-style-type: none">- поражение (некроз) всей толщи кожного покрова;- наличие полости, в которой скапливается экссудат (изъязвление и абсцесс).	



и
о
я
я;
а
ж
;
б
и
с
о





Пролежни тазобедренного сустава



Пролежни кисти рук





Профилактика пролежней

Профилактические мероприятия должны быть направлены на:

уменьшение давления на костные ткани

предупреждение трения и сдвига тканей во время
перемещения пациента или при его неправильном размещении

наблюдение за кожей над костными выступами

поддержание чистоты кожи и ее умеренной влажности

обеспечение пациента адекватным питанием и питьем

обучение пациента приемам самопомощи для перемещения

обучение близких

Рекомендуемые планы ухода при риске развития пролежней (у лежащего пациента)

Сестринские вмешательства	Кратность
1. Проведение текущей оценки риска развития пролежней не менее 1 раза в день (утром) по шкале Ватерлоу	Ежедневно 1 раз
2. Изменение положения пациента каждые 2 часа: 8-10 ч. – положение Фаулера; 10-12 ч. – положение Фаулера; 12-14 ч. – положение Фаулера; 14-16 ч. – положение Фаулера; 16-18 ч. – положение Фаулера; 18-20 ч. – положение Фаулера; 20-22 ч. – положение Фаулера; 0-2 ч. – положение Фаулера; 2-4 ч. – положение Фаулера; 4-6 ч. – положение Фаулера; 6-8 ч. – положение Фаулера;	Ежедневно 12 раз

Рекомендуемые планы ухода при риске развития пролежней (у лежащего пациента) *(продолжение таблицы)*


Сестринские вмешательства	Кратность
3. Обмывание загрязненных участков кожи	Ежедневно 1 раз
4. Проверка состояния постели при перемене положения (каждые 2 часа)	Ежедневно 12 раз
5. Обучение родственников пациента технике правильного перемещения (приподнимая над кроватью)	По индиви- дуальной программе
6. Определение количества съеденной пищи (количество белка не менее 120 г, аскорбиновой кислоты 500-1000 мг в сутки)	Ежедневно 4 раза
7. Обеспечение употребления не менее 1,5 л жидкости в сутки: с 9.00 – 13.00 ч. – 700 мл; с 13.00 – 18.00 ч. – 500 мл; с 18.00 – 22.00 ч. – 300 мл	В течение дня

Рекомендуемые планы ухода при риске развития пролежней (у лежащего пациента) (продолжение таблицы)


Сестринские вмешательства	Кратность
8. Использование поролоновых прокладок в зоне участков риска, исключающих давление на кожу	В течение дня
9. При недержании: - мочи – смена подгузников каждые 4 часа, - кала – смена подгузников немедленно после дефекации с последующей бережной гигиенической процедурой	В течение дня
10. При усилении болей – консультация врача	В течение дня
11. Обучение пациента и поощрение его изменять положение в постели (точки давления) с помощью перекладин, поручней и других приспособлений	В течение дня
12. Массаж кожи около участков риска	Ежедневно 4 раза
13. Обучение пациента дыхательным упражнениям и поощрение его выполнять их	В течение дня
14. Наблюдение за влажностью кожи и поддержание умеренную влажность	В течение дня

Рекомендуемые планы ухода при риске развития пролежней (у пациента, который может сидеть)

Сестринские вмешательства	Кратность
1. Проведение текущей оценки риска развития пролежней не менее 1 раза в день (утром) по шкале Ватерлоу	Ежедневно 1 раз
2. Изменение положения пациента 8-10 ч. – поло 10-12 ч. – поло 12-14 ч. – поло 14-16 ч. – поло 16-18 ч. – поло 18-20 ч. – поло 20-22 ч. – поло 22-24 ч. – поло 0-2 ч. – полож 2-4 ч. – положение «на правом боку»; 4-6 ч. – положение «на левом боку»; 6-8 ч. – положение Симса	Ежедневно 12 раз



Рекомендуемые планы ухода при риске развития пролежней (у пациента, который может сидеть) (*продолжение таблицы*)



6. Обучение пациента самостоятельному перемещению в кровати с помощью устройства для приподнимания

По индивидуальной программе

Рекомендуемые планы ухода при риске развития пролежней (у пациента, который может сидеть) (продолжение таблицы)

Сестринские вмешательства	Кратность
7. Обучение пациента технике безопасного самостоятельного перемещения с кровати в кресло с помощью других средств	По индивидуальной программе
8. Определение количества съеденной пищи (количество белка не менее 120 г, аскорбиновой кислоты 500-1000 мг в сутки)	Ежедневно 4 раза
9. Обеспечить употребление не менее 1,5 л жидкости в сутки: с 9.00 – 13.00 ч. – 700 мл; с 13.00 – 18.00 ч. – 500 мл; с 18.00 – 22.00 ч. – 300 мл	В течение дня
10. Использовать поролоновые прокладки, исключающие давление на кожу под участки риска, в т.ч. в положении пациента «сидя» (под стопы).	В течение дня

Рекомендуемые планы ухода при риске развития пролежней (у пациента, который может сидеть) (продолжение таблицы)

Сестринские вмешательства	Кратность
11. При недержании: - мочи – смена подгузников каждые 4 часа; - кала – смена подгузников немедленно после дефекации с последующей бережной гигиенической процедурой	В течение дня
12. При усилении болей – консультация врача	В течение дня
13. Обучение пациента и поощрение его изменять положение в постели (точки давления) с помощью перекладин, поручней и других приспособлений	В течение дня
14. Массаж кожи около участков риска	Ежедневно 4 раза