



ОБМЕН НУКЛЕОПРОТЕИНОВ


Переваривание нуклеотидов в ЖКТ




ПРОИСХОЖДЕНИЕ АТОМОВ ПУРИНОВОГО КОЛЬЦА



Синтез пуриновых нуклеотидов *de novo*




Синтез пуриновых нуклеотидов



ИНОЗИНОВАЯ
КИСЛОТА

глн

асп




ГМФ



ГДФ



ГТФ



АМФ




АДФ

↓


АТФ


"Запасные" пути синтеза пуриновых нуклеотидов (реутилизация азотистых оснований и нуклеозидов)

Аденинфосфорибозилтрансфераза, ответственная за образование АМФ




Гипоксантин-гуанинфосфориозилтрансфераза, катализирует образование ИМФ и ГМФ из гипоксантина и гуанина






Распад пуриновых нуклеозидов



РАСПАД ПИРИМИДИНОВЫХ ОСНОВАНИЙ




Нарушения обмена пиримидиновых нуклеотидов

- Оротацидурия
- Причина – врожденный дефект УМФ-синтазы.
- Клинические проявления:
 - мегалобластная анемия, которая не поддается лечению фолиевой кислотой
 - Неврологические нарушения
 - Повышенная чувствительность к инфекциям
 - Образование камней
 - Ранняя смерть
- Лечение – уридин

Подагра - системное заболевание, связанное с нарушением пуринового обмена, характеризующееся повышением содержания мочевой кислоты в крови, отложением ее солей (уратов) в суставных или околосуставных тканях и развивающимся в связи с этим воспалением.






Синдром Леша-Нихана обусловлен недостаточностью фермента гипоксантин-фосфорилтрансферазы (ГФРТ), который катализирует присоединение свободных пуриновых оснований (гуанина и гипоксантина) к нуклеотидам. Синдром встречается редко (1:300000 новорожденных), наследование идет по X-сцепленному рецессивному типу.


- При недостаточности фермента ГФРТ конечным продуктом превращения пуриновых оснований является мочевая кислота. Болезнь начинает развиваться в грудном возрасте, проявляясь мышечным гипертонусом, повышенной рефлексорной возбудимостью, олигофренией, склонностью ребенка к самоповреждениям. Высокое содержание мочевой кислоты и ее солей (диагностический признак), несмотря на усиленное выделение их с мочой, приводит к формированию камней в мочевыводящих путях, отложению солей мочевой кислоты в суставах.





Аллопуринол

Ксантин-
оксидаза




Аллоксантин

Гуанин




Ксантин




Мочевая
кислота

Гипоксантин




Ингибируется
аллопуринолом




**ОБМЕН ХРОМОПРОТЕИНОВ.
ПИГМЕНТНЫЙ ОБМЕН И ЕГО
НАРУШЕНИЯ**

Полость тонкого
кишечника

Аскорбиновая
кислота



Энтероцит



Апоферритин




Ферритин (Fe^{3+})

Кровь



Ферроксидаза




Трансферрин (Fe^{3+})

Ткани

Синтез
содержащих
железо
белков

Ферритин (Fe^{3+})





Синтез гема

