


# ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ

- Острый аппендицит - воспаление червеобразного отростка слепой кишки, одно из самых распространенных хирургических заболеваний.
- Заболеваемость острым аппендицитом составляет 4-5 человек на 1000 населения. Наиболее часто острый аппендицит встречается в возрасте от 20 до 40 лет, женщины болеют в 2 раза чаще, чем мужчины.
- Летальность составляет 0,1-0,3 %, послеоперационные осложнения - 5-9 %.


# Клиническая анатомия



# Варианты анатомии апендиккса



# Ретроперитонеальное размещение аппендикса



# Левостороннее размещение аппендикса



# Физиология

- Большинство исследователей считает его своеобразной миндалиной желудочно-кишечного тракта, поскольку он содержит в слизистой оболочке большое количество лимфоидной ткани. Лимфоидная ткань наиболее развита в детском возрасте, особенно в 12-16 лет. Начиная с 30 лет количество фолликулов значительно уменьшается, а к 60 годам они полностью исчезают.

# Этиология и патогенез

- ▣ Причины возникновения острого аппендицита до сих пор окончательно не установлены.
- ▣ Алиментарный фактор
- ▣ Глистная инвазия



# Классификация

1. Аппендикулярная колика
2. Простой поверхностной аппендицит
3. Деструктивный аппендицит
  - а. флегмонозный
  - б. гангренозный
  - в. перфоративный
4. Осложненный аппендицит
  - а. аппендикулярный инфильтрат
  - б. аппендикулярный абсцесс
  - в. розлитой гнойный перитонит
5. Другие осложнения острого аппендицита: пилефлебит, сепсис, локальные абсцессы брюшной полости, забрюшинная флегмона

# Клиническая симптоматика

- ▣ *симптома Кохера-Волковича*
- ▣ *рвота*
- ▣ *отсутствие стула*
- ▣ *нарушения мочеиспускания*
- ▣ *симптом Раздольского*
- ▣ *симптом Ровзинга*
- ▣ *симптом Ситковского*
- ▣ *симптом Бартомье-Михельсона*
- ▣ *повышение температуры тела*

# Клиническая симптоматика

- ▣ *защитное напряжение мышц брюшной стенки ( defense musculaire )*
- ▣ *симптом Щеткина-Блюмберга*
- ▣ *Симптом Воскресенского*

# Инструментальная диагностика




Рентгенография ОБП дает возможность в некоторых случаях диагностировать ОА и исключить другие острые хирургическое заболевания.

# Клинические проявления атипичных форм

- ▣ *Эмпиема червеобразного отростка* встречается в 1-2 % случаев острого аппендицита
- ▣ *Ретроцекальный острый аппендицит*
- ▣ *Тазовый острый аппендицит* (Низкое (тазовое) расположение червеобразного отростка встречается у 16 % мужчин и у 30 % женщин )
- ▣ *Подпеченочный острый аппендицит*
- ▣ *Левосторонний острый аппендицит*


# Анатомия аппендикса у беременных



# Дифференциальный диагноз

- ▣ Острый гастроэнтерит
- ▣ Острый панкреатит
- ▣ Прободная язва желудка или двенадцатиперстной кишки
- ▣ Острый холецистит
- ▣ Правосторонняя почечная колика
- ▣ Правосторонний пиелит

# Хирургические доступы



Хирургические доступы, используемые для аппендэктомии.


А - косой переменный (Волковича-Дьяконова).

Б - параректальный (Ленандера).


В - нижний срединный. Г - надлобковый («бикини»).



# Этапы типичной аппендэктомии



# Лапароскопическая аппендэктомия



# Осложнения острого аппендицита

- ▣ *аппендикулярный инфильтрат*
- ▣ *локальные абсцессы в брюшной полости*
- ▣ *разлитой гнойный перитонит*
- ▣ *септический тромбофлебит воротной вены и ее притоков (пилефлебит)*