

ЛЁГКАЯ ФОРМА УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ

Барановская Екатерина ЗДС

Определение

- Умственная отсталость — это стойкое, необратимое нарушение преимущественно познавательной деятельности, а также эмоционально-волевой и поведенческой сфер, обусловленное органическим поражением коры головного мозга.



Степени умственной отсталости

- I степень – дебильность. Составляет подавляющие 75% от общего количества случаев умственной отсталости у детей;
- II степень – имбецильность. Около 20%;
- III степень – идиотия. 5% от общего числа расстройств.



Дебильность

- Дебильность — самая легкая форма умственной отсталости, характеризующаяся значительным снижением способности к абстрактному мышлению и обобщению при сохранности моторики.



Общие сведения

- Дебильность является наиболее распространенным видом снижения интеллекта у детей. Она составляет около 75% всех случаев умственной отсталости.



Причины дебильности

- наследственные факторы (ферментопатии, эндокринопатии, микроцефалия);
- различные неблагоприятные влияния на плод в период внутриутробного развития инфекционные заболевания, перенесенные матерью в период беременности;



Причины дебильности

- резус-конфликт, фетоплацентарную недостаточность, гипоксию плода;
- токсические воздействия на плод, при употреблении беременной наркотических веществ, алкоголя, табака, некоторых медикаментов.



Общие сведения

- следствие родовой травмы, асфиксии новорожденного, врожденной гидроцефалии, перенесенных в раннем детстве инфекционных поражений ЦНС (энцефалита, гнойного менингита, менингоэнцефалита) и тяжелых черепно-



Признаки дебильности

- низкий уровень познавательной активности
- моторика практически не развивается
- значительное отставание в речевом развитии, маленький словарный запас
- ребенок играет в самые простые игры, поскольку он способен только подражать окружающ



Признаки дебильности

- настроение может резко колебаться без особых на то причин, возбудимость может быть как достаточно высокой, так и низкой
- ребенок воспринимает окружающий его мир со значительными трудностями, он не способен ориентироваться в пространстве

Признаки дебильности

- отсутствие абстрактного мышления, невозможность выполнить даже самые простые логические операции, мыслительные процессы замедлены или полностью отсутствуют
- концентрация внимания отличается непродолжительностью, переключение с одного вида деятельности на другой происходит с трудом




Диагностика дебильности

- Ребенок должен быть осмотрен неврологом, психологом и психиатром, при нарушениях речи — логопедом. Диагностировать дебильность помогает проведение психометрии, психологических тестов с сюжетными картинками и классификации изображений



Лечение при дебильности

- Наряду с медикаментозной терапией дети с дебильностью нуждаются в корригирующем лечении с применением педагогических, психологических и логопедических методик. Основная цель корригирующего лечения дебильности заключается в психологической поддержке, коррекции нарушений поведения и обучении.



Лечение при дебильности

- Для детей более старшего возраста — приобретении навыков и умений, необходимых для самостоятельной бытовой и профессиональной деятельности. По показаниям при дебильности проводятся логопедические занятия по коррекции системного недоразвития речи, коррекции брадилалии, коррекции заикания и пр.

