


Варикозная болезнь НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Поражение стенки вен нижних конечностей с факторами риска:

- Наследственность
- Ожирение
- Образ жизни
- Дисгормональные состояния
- Беременности




Схема симптомов и их лечение




Примерная схема лечения варикотромбофлебита

- Возвышенное положение конечности
- Компрессионная терапия
- Противовоспалительные нестероидного ряда
- Спазмолитики и сосудорасширяющие
 - миотропного действия
 - сосудорасширяющие
 - сочетанного действия




Миотропного действия

- Папаверин 2мл 2 раза в/мышечно или 2 табл. 3 раза в день, с 10-12 дн.
- Но-шпа 2 мл в/мышечно 2 раза в день или 2 табл. 3 раза в день до 10 дней.
Контроль АД!




Сосудорасширяющие

- Андекалин 40 ЕД в/м до 10-15 раз
- Ангиотрофин 1 мл в/мышечно до 10 дн.
- Никотиновая кислота по схеме
- Фосфоден по 1-2 табл. 3 раза в день 10 дней




Сочетанного действия

- Никоверин 1-2 табл. 2-3 раза в день -10 дней
- Никошпан 2 табл.3 раза в день 10 дней
- Эуфиллин 10%-2 мл в/м до 10 дней



Примерная схема лечения варикотромбофлебита

- Десенсибилизирующие
- Кортикостероиды до 25 мг преднизолон на 7 дней, затем снижение дозы препарата
- Диуретики – при отеках
- Флеботоники
- Витамины группы В, С
- Физиотерапия



Флеботоники

- Гливенол 1-2 капс. 2 раза в день, 10 дн.
- Анавенол 1 неделя - 2 драже 3 раза во время еды, затем по 1 драже 3 раза до 3 недель
- Вазонит 1200 мг в сутки до 15 дней
- Детралекс 1 неделя – по 2 капс. 3 раза, 2 неделя – по 1 капс. 3 раза, 3 неделя – по 1 капс. 2 раза

Спазмолитики

- Миотропного действия:
- - папаверин 2мл в/м 2 раза или 2 т. 3 раза 10-12 дн.
- - но-шпа 2мл в/м 2 раза или 2т. 3 раза 10-12 дн.
- Сосудорасширяющие:
- -андекалин, ангиотрофин, фосфоден 1-2 т.3 раза 10 дн.
- Сочетанного действия:
- -никоверин,никошпан, эуфиллин

