

Конференція на

тему:

TORCH інфекція і

вагітність

Таблиця. Інфекційні фактори невиношування вагітності

T	Токсоплазмоз
O (others)	Інші інфекції: абсолютні (сифіліс, хламідіоз, ентеровірусні інфекції, гепатити А і В, гонорея, лістеріоз); ймовірні (кір, епідемічний паротит); гіпотетичні (грип А, лімфоцитарний хоріоменінгіт, папіломавірусна інфекція)
R	Краснуха (rubella)
C	Цитомегаловірусна інфекція (ЦМВІ)
H	Герпесвірусна інфекція (ГВІ)

Актуальність теми:

- ▶ Внутрішньоутробні інфекції-це найбільш важлива причина невиношування вагітності, аномалії розвитку плода, фетального гепатиту, енцефаліту.. Тощо. Їх прояви в більшості визначаються у віддаленому від неонатального періоду віці у вигляді різних клінічних варіантів дисфункції.

Збудник

- **Віруси**

- цитомегаловірус
- Вірус краснухи,
- Вірус герпесу

- **бактерії**

- лістерії
- Бліда трепонема


- **Найпростіші**

- токсоплазма
- пневмоцисти

Патогенез.



Клініка



ПРОФІЛАКТИКА

1. Для жінок, які не хворіли краснухою рекомендується вакцинація перед запланованою вагітністю, не пізніше ніж за 3 місяці.



2 Для профілактики цитомегаловірусної інфекції рекомендується уникати контактів з інфікованими людьми і не допускати ослаблення імунітету.



3. Генітальний герпес – запобігання статевих контактів з інфікованими.



4. Токсоплазмоз – миття рук перед їжею, овочів і фруктів, садова і городня робота тільки в рукавицях, запобігання контактів з тваринами і їхніми продуктами життєдіяльності.

