

Тригонометрические уравнения

Преподаватель:
Сандакова О.В.

- <https://vk.com/club193919258>
- <https://ege-study.ru/>

1. Использование основных формул тригонометрии

1. Рассмотрим уравнение

$$2\cos^2 x + 5\sin x = 5.$$

Преобразуем его, применив основное тригонометрическое тождество:

$$2(1 - \sin^2 x) + 5\sin x = 5$$

$$2\sin^2 x - 5\sin x + 3 = 0.$$

Заменяя $\sin x$ на t , приходим к квадратному уравнению:

$$2t^2 - 5t + 3 = 0.$$

Решая его, получим:

$$t_1 = \frac{3}{2}, t_2 = 1.$$

Теперь вспоминаем, что мы обозначили за t . Первый корень приводит нас к уравнению $\sin x = \frac{3}{2}$. Оно не имеет решений, поскольку $-1 \leq \sin x \leq 1$.

Второй корень даёт простейшее уравнение $\sin x = 1$. Решаем его: $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$. Это и есть ответ.

2. Решить уравнение

$$3 + \cos 2x + 3\sqrt{2}\cos x = 0.$$

Здесь нужно применить формулу косинуса двойного угла. Какую именно? Судя по уравнению – ясно, что ту, которая с косинусом!

$$\begin{aligned}3 + 2\cos^2 x - 1 + 3\sqrt{2}\cos x &= 0 \\2\cos^2 x + 3\sqrt{2}\cos x + 2 &= 0.\end{aligned}$$

Теперь замена $t = \cos x$ и... дальше вы знаете.

3. Бывает, что оба рассмотренных выше метода нужно комбинировать. Например:

$$2\cos 2x - 3\cos^2 x - 2\sin x = 0.$$

Здесь всё подчиняется синусу. Именно через него выражаем косинус двойного угла, а $\cos^2 x$ выражаем из основного тригонометрического тождества:

$$2(1 - 2\sin^2 x) - 3(1 - \sin^2 x) - 2\sin x = 0.$$

Дальше понятно.

Разложение на множители

Очень хорошо, если уравнение удаётся представить в таком виде, что в левой части стоит произведение двух или нескольких множителей, а в правой части — ноль. Произведение двух или нескольких множителей равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы один из них равен нулю. Сложное уравнение, таким образом, распадается в совокупность более простых.

1. Начнём с уравнения

$$\sin 2x = \cos x.$$

Применяем формулу синуса двойного угла:

$$2\sin x \cos x = \cos x$$

Ни в коем случае не сокращайте на косинус! Ведь может случиться, что $\cos x$ обратится в нуль, и мы потеряем целую серию решений. Переносим всё в одну часть, и общий множитель — за скобки:

$$\begin{aligned} 2\sin x \cos x - \cos x &= 0 \\ \cos x (2\sin x - 1) &= 0. \end{aligned}$$

Полученное уравнение равносильно совокупности двух уравнений: $\cos x = 0$ и $2\sin x - 1 = 0$.

Решаем каждое из них и берём объединение множества решений.

$$\text{Ответ: } x_1 = \frac{\pi}{2} + \pi n, x_2 = (-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

2. Рассмотрим уравнение

$$\sin 3x + \sin 7x = 2\sin 5x.$$

Применим формулу суммы синусов:

$$2\sin 5x \cos 2x = 2\sin 5x.$$

Дальше действуем так же, как и в предыдущей задаче:

$$\begin{aligned} 2\sin 5x \cos 2x - 2\sin 5x &= 0 \\ 2\sin 5x (\cos 2x - 1) &= 0. \end{aligned}$$

Решаем уравнение $\sin 5x = 0$:

$$x = \frac{\pi n}{5}, n \in \mathbb{Z}. \quad (1)$$

Решаем уравнение $\cos 2x - 1 = 0$:

$$x = \pi n, n \in \mathbb{Z}. \quad (2)$$

Ну что, перечисляем обе серии (1) и (2) в ответе через запятую? Нет! Серия (2) является в данном случае частью серии (1). Действительно, если в формуле (1) число n кратно 5, то мы получаем все решения серии (2).

Поэтому ответ: $x = \frac{\pi n}{5}, n \in \mathbb{Z}$.

3. Бывает, что перед разложением суммы или разности тригонометрических функций в произведение надо сделать обратную процедуру: превратить произведение в сумму (разность).

Решим уравнение:

$$\sin 2x \sin 6x = \cos x \cos 3x.$$

Домножаем обе части на 2, преобразуем левую часть в разность косинусов, а правую часть – в сумму косинусов:

$$\begin{aligned} 2\sin 2x \sin 6x &= 2\cos x \cos 3x \\ \cos 4x - \cos 8x &= \cos 2x + \cos 4x \\ \cos 2x + \cos 8x &= 0 \\ 2\cos 5x \cos 3x &= 0. \end{aligned}$$

Ответ: $x_1 = \frac{\pi}{10} + \frac{\pi n}{5}$, $x_2 = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{3}$, $n \in \mathbb{Z}$.

4. Ещё пример, где финальное разложение на множители поначалу замаскировано:

$$\sin^2 2x + \sin^2 3x = 1.$$

Здесь используем формулу понижения степени:

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$$

(которая является ни чем иным, как переписанной в другом виде формулой косинуса двойного угла). Получаем:

$$\frac{1 - \cos 4x}{2} + \frac{1 - \cos 6x}{2} = 1$$
$$\cos 4x + \cos 6x = 0$$

и дальше ясно.

5. Многие оказываются в ступоре при виде следующего уравнения:

$$\sin 3x = \cos 5x.$$

Переносим косинус влево и применяем формулу приведения $\cos \alpha = \sin \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right)$:

$$\begin{aligned} \sin 3x - \cos 5x &= 0 \\ \sin 3x - \sin \left(\frac{\pi}{2} - 5x \right) &= 0. \end{aligned}$$

Дальше – дело техники.

6. А в этом примере нужны совсем другие манипуляции:

$$\sin 2x - \cos x + 2 \sin x = 1.$$

Раскладываем синус двойного угла, всё собираем в левой части и группируем:

$$\begin{aligned} 2 \sin x \cos x - \cos x + 2 \sin x - 1 &= 0 \\ \cos x (2 \sin x - 1) + (2 \sin x - 1) &= 0 \\ (2 \sin x - 1) (\cos x + 1) &= 0. \end{aligned}$$

Цель достигнута.

Однородные уравнения

Рассмотрим уравнение:

$$\sin^2 x + 2\sin x \cos x - 3\cos^2 x = 0.$$

Степень каждого слагаемого в левой части равна двум. Точно так же, как в обычном многочлене

$$a^2 + 2ab - 3b^2$$

степень каждого слагаемого равна двум (степень одночлена – это сумма степеней входящих в него сомножителей).

Поскольку степени всех слагаемых одинаковы, такое уравнение называют *однородным*. Для однородных уравнений существует стандартный приём решения – деление обеих его частей на $\cos^2 x$. Возможность этого деления, однако, должна быть обоснована: а что, если косинус равен нулю?

Следующий абзац предлагаем выучить наизусть и всегда прописывать его при решении однородных уравнений.

Предположим, что $\cos x = 0$. Тогда в силу уравнения и $\sin x = 0$, что противоречит основному тригонометрическому тождеству. Следовательно, любое решение данного уравнения удовлетворяет условию $\cos x \neq 0$, и мы можем поделить обе его части на $\cos^2 x$.

В результате деления приходим к равносильному квадратному уравнению относительно тангенса:

$$tg^2 x + 2tg x - 3 = 0$$

и дальнейший ход решения трудностей не представляет

1. Рассмотрим уравнение

$$10\sin^2 x + 5\sin x \cos x + \cos^2 x = 3.$$

Если бы в правой части стоял нуль, уравнение было бы однородным. Мы поправим ситуацию изящным приёмом: заменим число 3 на выражение $3(\sin^2 x + \cos^2 x)$:

$$10\sin^2 x + 5\sin x \cos x + \cos^2 x = 3(\sin^2 x + \cos^2 x)$$

$$7\sin^2 x + 5\sin x \cos x - 2\cos^2 x = 0$$

и дело сделано.

2. Неожиданным образом сводится к однородному следующее уравнение:

$$3\cos x + 2\sin x = 1.$$

Казалось бы, где тут однородность? Переходим к половинному углу!

$$3\left(\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}\right) + 4\sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = \cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}$$

$$4\sin^2 \frac{x}{2} - 4\sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} - 2\cos^2 \frac{x}{2} = 0$$

$$2\operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} - 2\operatorname{tg} \frac{x}{2} - 1 = 0$$

$$\operatorname{tg} \frac{x}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{3}}{2}$$

откуда

$$x = 2\operatorname{arctg} \frac{1 \pm \sqrt{3}}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}. \quad (3)$$

Введение дополнительного угла

Этот метод применяется для уравнений вида $a \cos x + b \sin x = c$. Он присутствует в школьных учебниках. Правда, в них рассматриваются только частные случаи – когда числа a и b являются значениями синуса и косинуса углов в 30° , 45° или 60° .

1. Рассмотрим уравнение

$$\sqrt{3} \sin x + \cos x = 2.$$

Делим обе части на 2:

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos x = 1.$$

Замечаем, что $\frac{\sqrt{3}}{2} = \cos \frac{\pi}{6}$, $\frac{1}{2} = \sin \frac{\pi}{6}$:

$$\cos \frac{\pi}{6} \sin x + \sin \frac{\pi}{6} \cos x = 1.$$

В левой части получили синус суммы:

$$\sin \left(x + \frac{\pi}{6} \right) = 1,$$

откуда $x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$ и $x = \frac{\pi}{3} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

2. Другой пример:

$$\cos x + \sin x = 1.$$

Делим обе части на $\sqrt{2}$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \cos x + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin x = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Сделаем теперь для разнообразия в левой части косинус разности:

$$\cos \frac{\pi}{4} \cos x + \sin \frac{\pi}{4} \sin x = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$x - \frac{\pi}{4} = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi n$$

$$x_1 = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad x_2 = 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

4. Рассмотрим уравнение

$$\sin 2x \sin 5x = 1.$$

Ясно, что данное равенство может выполняться лишь в двух случаях: когда оба синуса одновременно равны 1 или -1. Действуя так, мы должны были бы поочерёдно рассмотреть две системы уравнений.

Лучше поступить по-другому: умножим обе части на 2 и преобразуем левую часть в разность косинусов:

$$\begin{aligned} 2 \sin 2x \sin 5x &= 2 \\ \cos 3x - \cos 7x &= 2. \end{aligned}$$

Тем самым мы сокращаем работу вдвое, получая лишь одну систему:

$$\begin{cases} \cos 3x = 1, \\ \cos 7x = -1. \end{cases}$$

Имеем:

$$\begin{cases} 3x = 2\pi n \\ 7x = \pi + 2\pi k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2\pi n}{3}, \\ x = \frac{\pi}{7} + \frac{2\pi k}{7} \end{cases}, n, k \in \mathbb{Z}.$$

Ищем пересечение:

$$\frac{2\pi n}{3} = \frac{\pi}{7} + \frac{2\pi k}{7}.$$

Умножаем на 21 и сокращаем на π .

$$14n = 3 + 6k.$$

Данное равенство невозможно, так как в левой части стоит чётное число, а в правой – нечётное.

Ответ: решений нет.