

# Разложение вектора по трем некопланарным векторам



# Цели урока

- **Рассмотреть теорему о разложении вектора по трем некопланарным векторам.**

# Новый материал

*Теорема о разложении вектора по трем некопланарным векторам.*

*Любой вектор можно разложить по трем данным некопланарным векторам, причем коэффициенты разложения определяются единственным образом.*

*Дано :  $\vec{a}, \vec{b}, c$  – некопланарны*

*$\vec{p}$*


*Доказать : 1)  $\vec{p} = x \vec{a} + y \vec{b} + z \vec{c}$ ,*

*2) коэффициенты  $x, y, z$  определяются единственным образом.*

# Доказательство

1) Отложим векторы  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  и  $\vec{p}$  от одной точки.

Через точку  $P$ , проведем  $PP_1 \parallel OC$ ,  $P_1 \in (AOB)$ .



Тогда по правилу треугольника  $\vec{OP} = \vec{OP}_1 + \vec{P}_1P$ .

$\vec{OP}_1 = x\vec{a} + y\vec{b}$ , т.к.  $\vec{OP}_1$ ,  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  — компланарны.

$\vec{P}_1P = z\vec{c}$ , т.к.  $\vec{P}_1P \parallel \vec{c}$ .

Следовательно,  $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$ .

Если  $\vec{p} \parallel \vec{c}$ , то  $\vec{p} = 0 \cdot \vec{a} + 0 \cdot \vec{b} + z \cdot \vec{c}$ .

# Доказательство

*Докажем единственность коэффициентов разложения.*

Пусть  $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$  и  $\vec{p} = x_1\vec{a} + y_1\vec{b} + z_1\vec{c}$ ,

следовательно,  $x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} = x_1\vec{a} + y_1\vec{b} + z_1\vec{c}$ .

$$(x - x_1)\vec{a} + (y - y_1)\vec{b} + (z - z_1)\vec{c} = \vec{0}$$

Пусть  $x - x_1 \neq 0$ . Делим на  $x - x_1$  обе части равенства :


$$\vec{a} + \frac{y - y_1}{x - x_1}\vec{b} + \frac{z - z_1}{x - x_1}\vec{c} = \vec{0} \quad \text{Откуда } \vec{a} = -\frac{y - y_1}{x - x_1}\vec{b} - \frac{z - z_1}{x - x_1}\vec{c};$$

т.е.  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  и  $\vec{c}$  — компланарны, что противоречит условию,

значит,  $x = x_1$ ,  $y = y_1$ ,  $z = z_1$ , ч.т.д.

# Решение задач

361




$$\vec{CD} = -\vec{AB} = 0 \cdot \vec{AA_1} - \vec{AB} + 0 \cdot \vec{AD};$$

$$\begin{aligned} \vec{D_1O} &= \frac{1}{2} \vec{D_1B} = \frac{1}{2} \left( \vec{D_1A_1} + \vec{D_1C_1} + \vec{D_1D} \right) = \\ &= \frac{1}{2} \left( -\vec{AD} + \vec{AB} - \vec{AA_1} \right) = \\ &= -\frac{1}{2} \vec{AA_1} + \frac{1}{2} \vec{AB} - \frac{1}{2} \vec{AD}. \end{aligned}$$

Ответ:

# Решение задач

363



$\vec{AD} = \vec{BC}$ , так как  $ABCD$  – параллелограмм;

$$\vec{OD} - \vec{OA} = \vec{OC} - \vec{OB};$$

$$\vec{OD} = \vec{OA} + \vec{OC} - \vec{OB};$$

$$\vec{OD} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c};$$


$\vec{OM} = \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OC})$ , так как  $M$  – середина отрезка  $AC$ ;

$$\vec{OM} = \frac{1}{2}\vec{a} + 0 \cdot \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}.$$

Ответ:

# Решение задач

367



Дано :  $ABCD$  – тетраэдр

$AA_1$  – медиана грани  $ABC$ ,

$$K \in AA_1, \frac{AK}{KA_1} = \frac{3}{4}.$$

Разложить : вектор  $\vec{DK}$  по векторам  $\vec{DA}$ ,  $\vec{DB}$ ,  $\vec{DC}$ .

$$\text{Решение : } 7 \vec{AK} = 3 \vec{KA_1}; \quad 7(\vec{DK} - \vec{DA}) = 3(\vec{DA_1} - \vec{DK});$$

$$10 \vec{DK} = 7 \vec{DA} + 3 \vec{DA_1};$$

$$\vec{DA_1} = \frac{1}{2}(\vec{DB} + \vec{DC}), \text{ так как } A_1 \text{ – середина отрезка } BC;$$

$$10 \vec{DK} = 7 \vec{DA} + 3 \cdot \frac{1}{2}(\vec{DB} + \vec{DC}); \quad \vec{DK} = 0,7 \vec{DA} + \frac{3}{20} \vec{DB} + \frac{3}{20} \vec{DC};$$

$$\text{Ответ : } \vec{DK} = 0,7 \vec{DA} + \frac{3}{20} \vec{DB} + \frac{3}{20} \vec{DC};$$





**Спасибо!**