


Основные положения МКТ



1. Молекулярная физика

1.1. Основы МКТ

Тема урока. Микропараметры вещества

План урока

1. Микро- и макропараметры.

2. Размеры молекул.

3. Число молекул.

4. Масса молекулы.

5. Количество вещества.

6. Молярная масса.

7. Формулы.



Молекулярная физика - раздел науки физики, в которой изучаются физические свойства вещества и явления, происходящие в них.

Термодинамика – раздел физики, в котором изучаются законы теплового (термо) движения и его превращения (динамика) в другие виды движения.


Молекула – наименьшие электрически нейтральные частицы вещества, обладающие основными его химическими свойствами. *Они состоят из атомов.*

Атомы – химически неделимые частицы, из которых состоят молекулы.

Одинаковые или различные атомы соединены в молекулах в одно целое химическими связями.

СОЗДАТЕЛИ АТОМНОЙ ТЕОРИИ



Джон
Дальтон



Амедео
Авогадро

Резерфорд

Дмитрий
Менделеев



Эрнест

Микро- и макропараметры

Микропараметры вещества характеризуют каждую частицу вещества в отдельности, в отличие от макропараметров, характеризующих вещество в целом.

К микропараметрам вещества относятся: размеры молекул, масса молекулы, количество вещества (так как отражает количество структурных единиц в веществе), молярная масса и др.

К макропараметрам относятся: давление, объем тела, масса вещества, температура и др.

Основные положения МКТ

- *Все тела состоят из малых частиц, между которыми есть промежутки.*
- *Частицы тел постоянно и беспорядочно движутся.*
- *Частицы тел взаимодействуют друг с другом: притягиваются и отталкиваются.*


ПЕРВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Все вещества – жидкие, твердые и газообразные – образованы из мельчайших частиц – *молекул, атомов, ионов*. Молекулы и атомы представляют собой электрически нейтральные частицы.


При определенных условиях молекулы и атомы могут приобретать дополнительный электрический заряд и превращаться в положительные или отрицательные *ионы*.

ВТОРОЕ ПОЛОЖЕНИЕ


Траектория одной
частицы



Движение
молекул
газа




Движение
молекул
твердых
тел



ТРЕТЬЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Частицы взаимодействуют друг с другом силами, имеющими электрическую природу.



Гравитационное взаимодействие между частицами пренебрежимо мало.



ОПЫТНЫЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

I положение


- 1. Дробление вещества
- 2. Испарение жидкостей
- 3. Расширение тел при нагревании



ОПЫТНЫЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

II положение


- 1. Диффузия – *перемешивание молекул разных веществ*
- 2. Броуновское движение – *движение взвешенных в жидкости частиц*




ОПЫТНЫЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

III положение

1. Силы упругости
2. Прилипание свинцовых цилиндров
3. Смачивание
4. Поверхностное натяжение



ОЦЕНКА РАЗМЕРОВ МОЛЕКУЛ



Вопросы:

- а) Какими свойствами должна обладать выбранная жидкость?
- б) Какая геометрическая формула может быть использована?
- в) Как рассчитать объем одной капли?

Количество вещества

В единице массы, 1 килограмме вещества, находится разное количество структурных единиц – атомов, молекул. Зависит это количество частиц от рода вещества.



А в единице количества вещества - 1 моле, находится

одинаковое количество частиц.



КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА

- В молекулярно-кинетической теории *количество вещества* принято считать пропорциональным числу частиц. Единица количества вещества называется **молем** (моль).
- **Моль** – это количество вещества, содержащее столько же частиц (молекул), сколько содержится атомов в 0,012 кг углерода ^{12}C .

ФОРМУЛЫ

$$\nu = \frac{N}{N_A}$$

$$\nu = \frac{m}{M}$$

N – число частиц вещества

N_A – число Авогадро

ν – количество вещества

m – масса вещества

M – молярная масса вещества

Постоянная Авогадро

- В одном моле любого вещества содержится одно и то же число частиц (молекул). Это число называется *постоянной Авогадро* N_A :

$$N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$$

Все газы двухатомны, кроме инертных

$$M(\text{H}_2) = 2 \text{ г/моль}$$

$$M(\text{O}_2) = 32 \text{ г/моль}$$

$$M(\text{N}_2) = 28 \text{ г/моль}$$

$$M(\text{He}) = 4 \text{ г/моль}$$

МАССА МОЛЕКУЛЫ

$$m_0 = \frac{M}{N_A}$$

m_0 – масса
молекулы

M – молярная
масса

N_A – число
Авогадро

МОЛЯРНАЯ МАССА

Молярной массой называют массу вещества, взятого в количестве 1 моля.

$$M = m_0 N_A$$

$$[M] = 1 \frac{\text{КГ}}{\text{МОЛЬ}}$$

ЗАДАЧИ

- 1. Рассчитать массу молекулы H_2SO_4 .

$$M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 2 \cdot 1 + 32 + 16 \cdot 4 = 98 \text{ г/моль}$$

$$m_0 = \frac{M}{N_A}$$

$$m_0 = \frac{98 \text{ г / моль}}{6 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}} = \underline{16 \cdot 10^{-23} \text{ г}}$$