



Бронхоэктатическая болезнь



Работу выполнила
студентка 1 курса 110
группы Сыктывкарского
медицинского колледжа
им. И. П. Морозова
Иванова Диана


БРОНХОЭКТАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ -

приобретенное (в ряде случаев врожденное) заболевание, характеризующееся хроническим прогрессирующим процессом в необратимо измененных (расширенных, деформированных) и функционально неполноценных бронхах, преимущественно нижних отделов легких. Как правило бронхоэктатическая болезнь двусторонний процесс (55% в левом лёгком, 45% в правом)




- **Бронхоэктатическая болезнь** характеризуется сочетанием бронхоэктазов, пневмосклероза, гипертонии малого круга кровообращения и «легочного сердца». Она течет с частыми обострениями воспаления и соответственно увеличения объема склероза легких. Постепенно склеротические изменения приводят к деформации легких и тогда говорят о пневмоциррозе.

BRONCHIECTASIS (obstructive lung disease)




бронхоэктатическая болезнь



Клиническая картина бронхоэктатической болезни




характеризуется сменой периодов обострения с активацией бронхолегочной инфекции и периодов клинической ремиссии, когда все проявления болезни затихают.



- **Причиной** первичных бронхоэктазов служат врожденные пороки развития бронхов – недоразвитие бронхиальной стенки. Приобретенные бронхоэктазы возникают в результате частых бронхолегочных инфекций, перенесенных в детском возрасте – бронхопневмонии, туберкулеза или абсцесса легкого. Иногда развивается вследствие попадания инородных тел в просвет бронхов.


БРОНХОЭКТАТИЧЕСКАЯ
БОЛЕЗНЬ

НОРМА





- Хроническое воспаление бронхиального дерева вызывает изменения в слизистом и мышечном слоях бронхов, а также в перибронхиальной ткани. Становясь податливыми, пораженные стенки бронхов расширяются. Пневмосклеротические процессы в легочной ткани после перенесенных бронхитов, пневмоний, туберкулеза или абсцесса легкого приводят сморщиванию легочной паренхимы и растяжению, деформации бронхиальных стенок. Деструктивные процессы также поражают нервные окончания, артериолы и капилляры, питающие бронхи.

Бронхоэктатическая болезнь




- Веретенообразные и цилиндрические бронхоэктазы поражают крупные и средние бронхи, мешотчатые – более мелкие. Неинфицированные бронхоэктазы, немногочисленные и небольшие по размерам, могут длительное время не проявлять себя клинически. С присоединением инфекции и развитием воспалительного процесса бронхоэктазы заполняются гнойной мокротой, поддерживающей хроническое воспаление в видоизмененных бронхах. Так развивается бронхоэктатическая болезнь.





Осложненное течение бронхоэктатической болезни

характеризуется признаками тяжелой формы, к которым присоединяются вторичные осложнения: сердечно-легочная недостаточность, «легочное сердце», амилоидоз почек, печени, нефрит и др. Также длительное течение бронхоэктатической болезни может осложняться железодефицитной анемией, абсцессом легких, эмпиемой плевры, легочным кровотечением.

Нормальные бронхи



Бронхоэктаз



Спасибо за внимание