

«Анатомические и физиологические основы СЛР»

Подготовила Низамова Дарина Илгизаровна группа №227.

Сердечно – лёгочная реанимация (СЛР)





ПЛАКАТ № 8
 Национальный институт
 повышения квалификации
 специалистов в области
 здравоохранения
 Республики Беларусь

Сердечно-легочная реанимация



Дорогие транспортные перевозчики могут предотвратить случаи внезапной **клинической смерти** и/или длительной и необратимой в пострадавшем состоянии удушья пассажира на свет. Движком реанимационных или на летатель аппаратурах, а также самолёт укомплектован

специальными (системами клинической смерти) - медицинскими системами оказания помощи в самолётах. В этот период необходимо немедленно обратиться к медицинскому персоналу, чтобы получить необходимые медицинские услуги по оказанию первой и дальнейшей помощи.



1

Признаки клинической смерти

1. **Отсутствует дыхание** - не происходит заполнения воздушной полости, расположенной над глотком и ниже гортани.
 2. **Отсутствует пульс** на сонной артерии (с любой стороны, на тыльной стороне).
 3. **Отсутствует пульс** на сонной артерии (с любой стороны, на тыльной стороне).
- Возможны проявления реанимационных и сердечно-легочных



2



3

Реанимация

Реанимация - ряд мероприятий, направленных на восстановление жизни пострадавшего, у которого внезапно прекратилось дыхание и кровообращение, т.е. наступила клиническая смерть.

Эффективность реанимации определяется объективными клиническими критериями:

- восстановление (при отсутствии клинических признаков) самостоятельного дыхания;
- наличие пульса;
- сознательность.

Последовательность мероприятий

1. Освобождение дыхательных путей.
2. Искусственное дыхание.
3. Вскрытие (депримия) венной системы.

Освобождение дыхательных путей

Нарушение деятельности дыхательной системы является частой причиной смерти. Причиной данного состояния могут быть: спазм или расслабление тонуса гортани, истончение языка, западение языка назад и вперед, западание языка назад и вперед, западание языка в переднюю часть гортани. В этих случаях необходимо немедленно обратиться к медицинскому персоналу, чтобы получить необходимые медицинские услуги по оказанию первой и дальнейшей помощи. Она предполагает наличие навыков для оказания пострадавшему и требует немедленного проведения реанимационных мероприятий и/или.



1



2

1. Поднять пострадавшего на спину на уровне плечевых суставов, подложить подбородок, поднять д. Расположить голову, шею - все, что мешает свободному дыханию.

2. Поднять подбородок пострадавшего, отвести язык назад, отвести подбородок вперед или назад. Поднять подбородок пострадавшего, отвести язык назад, отвести подбородок вперед или назад. Поднять подбородок пострадавшего, отвести язык назад, отвести подбородок вперед или назад.



3



4

3. Чтобы избежать западания языка, подложить под язык и подбородок.

4. Сделать искусственное дыхание пострадавшему.



а



б



в



г



д



е



ж



з



и






к



л



м





Спасибо за внимание!

