

# «Анатомические и физиологические основы СЛР»

Подготовила Низамова Дарина Илгизаровна группа №227.

# Сердечно – лёгочная реанимация (СЛР)





**ПЛАКАТ № 8**  
 Национальный институт  
 повышения квалификации  
 специалистов в области  
 здравоохранения  
 Республики Беларусь

# Сердечно-легочная реанимация



Дорогие транспортные перевозчики могут предотвратить случаи внезапной **клинической смерти** и/или длительной и необратимой в пострадавшем состоянии удушья пассажира на свет. Движком реанимационных или на летатель аппаратурах, а также самолёт уполномочен

или инструктор. Система клинической смерти - потерянная способность вернуть жизнь и сознание. В этот период необходимо немедленно обратиться к врачу или медсестре, чтобы добиться восстановления сердечной деятельности и/или дыхания пассажира.



1

## Признаки клинической смерти

1. Отсутствие дыхания - не происходит заполнения воздушной полости, расположенной над глотком и ниже гортани.
  2. Отсутствие пульса на сонной артерии (с любой стороны, на толщину одного пальца).
  3. Отсутствие пульса на лучевой артерии (с любой стороны, на толщину одного пальца).
- Возможны проявления рвоты, судорог, тахикардия.



2



3

## Реанимация

**Реанимация** - ряд мероприятий, направленных на восстановление жизни пострадавшего, у которого внезапно прекратилось дыхание и кровообращение, т.е. наступила клиническая смерть.

**Эффективность реанимации** определяется объективными клиническими критериями:

- восстановление сознания (приступил к движению в течение 2-4 минут) и/или самостоятельное восстановление в сознании пострадавшего;
- наличие пульса;
- наличие дыхания.

## Последовательность мероприятий

1. Освобождение дыхательных путей.
2. Искусственное дыхание.
3. Вскрытие (депримия) венной системы.

## Освобождение дыхательных путей

Нарушение деятельности дыхательных путей является частой причиной смерти. Причиной данного состояния могут быть: спад языка на гортань, выделение слюны, истончение языка, рвотный рефлекс, западание языка, западание языка в носовую полость, западание языка в носовую полость. В этих случаях требуется немедленное освобождение дыхательных путей, которое осуществляется в три этапа: 1. удаление рвотных масс. Она представляет большую опасность для жизни пострадавшего и требует немедленного проведения реанимационных мероприятий. **Положение головы:** запрокинуто на максимальное расстояние вправо.



1



2

1. Положение пострадавшего на спине на твердой поверхности, подложить судно, платок и т.д. Расположить голову, шею - все это фиксируется свободными руками.

2. Раскрыть рот пострадавшего. Осмотреть язык, удалить рвотные массы, слюну, западающий язык. Проверить наличие западающего языка. Если западающий язык, то его необходимо отвести назад, не надавливая на основание языка (подвернуть язычок назад).



3



4

3. Чтобы избежать западания языка, подложить под шею и голову валик.

4. Шею запрокинуть голову пострадавшего.



а



б



в



г



д



е



ж



з



и






к



л



м





**Спасибо за внимание!**

