

Глистные заболевания

ПРИЧИНЫ

- Глисты – это паразитические черви различной формы и размеров.
- Они живут в организме диких и домашних животных, а некоторые и в теле человека.
- Глисты питаются готовыми питательными веществами, выделяют яды, которые отравляют организм хозяина.



Наиболее часто человек заражается:

Острицами
Аскаридами
Цепнями





- **Острицы** – мелкие чуть более сантиметра, тонкие круглые черви, серо-белого цвета.


Заболевание, возникающее при заражении ими, называется энтеробиоз.

Заражение этими глистами происходит при попадании яиц паразита через рот с плохо вымытыми овощами и фруктами, с немытых рук, после контакта с почвой или зараженными домашними животными.





Аскариды – крупные круглые черви, красно-желтого цвета, во взрослом состоянии достигающие длины до 40 см. Заболевание, вызываемое ими, называется «аскаридоз». Развитие паразита начинается после попадания яиц через рот в кишечник, вылупившиеся личинки, проникают через кишечную стенку в кровь. Проходя по пути миграции через стенку кишечника, печень в легкие, личинки аскарид оказывают травмирующее действие на ткани, вызывая кровоизлияния и воспалительные изменения в них. К концу своего пути, в легких, личинка аскариды вырастает до 2-х мм. В легких личинка проникает в альвеолы, из них в бронхи и вместе с мокротой попадает вновь в желудочно-кишечный тракт, где и развивается во взрослую особь.



- **Свиной и бычий цепень** – сходные по строению ленточные черви длиной до 6 метров.
- У человека паразитируют в тонком кишечнике.
- Заражение происходит при употреблении мяса свиней или крупного рогатого скота, содержащего одну из промежуточных форм цепня – финны (белесые пузырьки размером до 0,5 см).
- В тонком кишечнике зародыш прикрепляется к стенке и через три месяца превращается в половозрелого паразита.



Признаки

- Люди, заражённые глистами,
- быстрее утомляются,
 - становятся рассеянными,
 - появляются головные боли,
 - тошнота,
 - рвота,
 - может развиться малокровие.



Переносчики

Распространению яиц глистов способствуют мухи

- Заражение чаще всего происходит через грязные руки, немытые фрукты и овощи, при общении с бродячими и домашними животными
- Заразиться цепнями можно через плохо проваренные или не прожаренные мясо и рыбу
- Заражённый глистами человек нередко становится источником заражения других людей
-



Профилактика и первая ПОМОЩЬ

- Соблюдать гигиену питания
- Употреблять в пищу хорошо проваренное и прожаренное мясо и рыбу
- Бороться с мухами
- Для лечения необходимо обратиться к врачу, точно соблюдать его предписания



Профилактика



Мытьё рук после посещения туалета, а также перед едой является обязательным



Необходимо систематически стричь ногти, так как под ними чаще всего задерживаются яйца паразитических червей.



Источником заражения глистными заболеваниями может явиться недоваренная рыба, плохо прожаренное мясо.



Профилактика



Мойте руки



Мойте овощи и фрукты



Употребляйте в пищу хорошо прожаренное мясо



Уничтожайте насекомых - переносчиков кишечных инфекций

Закрепление

Заполни таблицу « Глистные заболевания»

Способ заражения	Признаки заболевания	Меры профилактики



Проверь себя!

- Глистные заболевания

Способ заражения	Признаки заболевания	Меры профилактики
Грязные руки	Плохой сон	Содержи в чистоте руки
Немытые продукты	Тошнота по утрам	Следи за чистотой тела, белья
Непроваренная пища	Острые боли в животе	Уничтожай мух
	Бледность лица	Содержи в чистоте унитаза
	Общая слабость	Не трогай уличных животных
	Нервозность	





Будьте здоровы!

