

# Глистные заболевания

# ПРИЧИНЫ

- Глисты – это паразитические черви различной формы и размеров.
- Они живут в организме диких и домашних животных, а некоторые и в теле человека.
- Глисты питаются готовыми питательными веществами, выделяют яды, которые отравляют организм хозяина.



**Наиболее часто человек заражается:**

**Острицами**  
**Аскаридами**  
**Цепнями**





- **Острицы** – мелкие чуть более сантиметра, тонкие круглые черви, серо-белого цвета.


Заболевание, возникающее при заражении ими, называется энтеробиоз.

Заражение этими глистами происходит при попадании яиц паразита через рот с плохо вымытыми овощами и фруктами, с немытых рук, после контакта с почвой или зараженными домашними животными.





**Аскариды** – крупные круглые черви, красно-желтого цвета, во взрослом состоянии достигающие длины до 40 см. Заболевание, вызываемое ими, называется «аскаридоз». Развитие паразита начинается после попадания яиц через рот в кишечник, вылупившиеся личинки, проникают через кишечную стенку в кровь. Проходя по пути миграции через стенку кишечника, печень в легкие, личинки аскарид оказывают травмирующее действие на ткани, вызывая кровоизлияния и воспалительные изменения в них. К концу своего пути, в легких, личинка аскариды вырастает до 2-х мм. В легких личинка проникает в альвеолы, из них в бронхи и вместе с мокротой попадает вновь в желудочно-кишечный тракт, где и развивается во взрослую особь.





- **Свиной и бычий цепень** – сходные по строению ленточные черви длиной до 6 метров.
- У человека паразитируют в тонком кишечнике.
- Заражение происходит при употреблении мяса свиней или крупного рогатого скота, содержащего одну из промежуточных форм цепня – финны (белесые пузырьки размером до 0,5 см).
- В тонком кишечнике зародыш прикрепляется к стенке и через три месяца превращается в половозрелого паразита.



# Признаки

- Люди, заражённые глистами,
- быстрее утомляются,
  - становятся рассеянными,
  - появляются головные боли,
  - тошнота,
  - рвота,
  - может развиться малокровие.



# Переносчики

Распространению яиц глистов способствуют мухи

- Заражение чаще всего происходит через грязные руки, немытые фрукты и овощи, при общении с бродячими и домашними животными
- Заразиться цепнями можно через плохо проваренные или не прожаренные мясо и рыбу
- Заражённый глистами человек нередко становится источником заражения других людей
- 





# Профилактика и первая ПОМОЩЬ

- Соблюдать гигиену питания
- Употреблять в пищу хорошо проваренное и прожаренное мясо и рыбу
- Бороться с мухами
- Для лечения необходимо обратиться к врачу, точно соблюдать его предписания



# Профилактика



**Мытьё рук после посещения туалета, а также перед едой является обязательным**



**Необходимо систематически стричь ногти, так как под ними чаще всего задерживаются яйца паразитических червей.**



**Источником заражения глистными заболеваниями может явиться недоваренная рыба, плохо прожаренное мясо.**



# Профилактика



**Мойте руки**



**Мойте овощи и фрукты**



**Употребляйте в пищу хорошо прожаренное мясо**



**Уничтожайте насекомых - переносчиков кишечных инфекций**

# Закрепление

Заполни таблицу « Глистные заболевания»

Способ заражения	Признаки заболевания	Меры профилактики



# Проверь себя!

- Глистные заболевания

Способ заражения	Признаки заболевания	Меры профилактики
Грязные руки	Плохой сон	Содержи в чистоте руки
Немытые продукты	Тошнота по утрам	Следи за чистотой тела, белья
Непроваренная пища	Острые боли в животе	Уничтожай мух
	Бледность лица	Содержи в чистоте унитаза
	Общая слабость	Не трогай уличных животных
	Нервозность	







**Будьте здоровы!**

