

# Іценко- Кушинга (АКТГ продукуюча пухлина гіпофіза) прогресуючий перебіг сер. важкості в ст. загострення

1. ПІДВИЩЕНИЙ АТ (140/90)
  2. ГОЛОВНІ БОЛІ
  3. ДИСПЛАСТИЧНЕ ОЖИРІННЯ
  4. СТРІЇ НА ЖИВОТІ БАГРОВІ, ДУЖЕ ШИРОКІ
-

## 1.ЗАК – панцитоз

---

2. холестерин – підвищений

3. NA, Cl – підвищені; K – знижений

4. диспротеїнемія – зменшення альбумінів

5. ЕКГ - синусова тахікардія, дистрофічні зміни в міокарді

6.ОТТГ – стероїдний ЦД

7. УЗД – збільшення наднирників, гіперплазія

8. МРТ ГМ – аденома гіпофіза

9. рентген черепа – деструкція турецького сідла

10. гормони – АКТГ (підвищені); кортизол ( підвищений); ДГА (підвищений); альдостерон ( N)

11. мала дексаметазонова проба «-»; велика – «+»

- 
1. №8
  2. Оперативне видалення аденоми гіпофіза
  3. Bromocriptin – 0,0025 (1т. 2 р/д під контролем АКТГ)
  4. Bisoprolol 0,005 ( 1 т. вранці під контролем АТ)