




Жедел аппендицит- соқыр ішектің құрт тәрізді өсіндісінің қабынуы. Жедел аппендицит нәрестелерден бастап барлық жастағы балаларда , ең жиі 9-12 жас аралығындағыларда кездеседі. Балалардағы жедел аппендицит тез дамып жедел асқынады



Жедел аппендицит хамелеон тәрізді ауру ,
себебі оны мүмкін орныан таба алмай , ал
мүмкін емес жерден табуға болады



Жедел аппендициттің клиникасының әркелкі болуы , оның диагностикасында үлкен қиындық туғызып, нақты диагноз қоюда қателіктер кездесіп жатады.



 Просто о
здоровье
www.vk.com/prosto_o_z

Воспалённый
аппендикс

*Симптомы
аппендицита
у детей*

Көбіне диагноз қоюда қателіктер жіберудің себептерінің ішінде жиі кездесетіні, балаларды біріншілік қарауды хирургтар емес, педиатрлар немесе жедел жәрдем қызметкерлері қарайды.



Диагностикасындағы қателіктер ауруханаға дейін және ауруханада болуы мүмкін



Дене температурасының жоғарылауы, жедел аппендицитті басқа аурулардан диагностикалауда қателіктер жіберуге септігін тігізеді



Пациентті қарап тексеру кезінде ауру сезімінің құбылмалы болуы



Ішектің тума және жүре пайда болған аурулары



Жедел аппендициттің диагностикасында
қоюда пневмония да диагнозды қоюда
қателіктерге алып келеді



Бүйрек коликасы



ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ



