

# КАКОЙ ПРЕПАРАТ НАЗНАЧИТЬ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНСУЛЬТА?



? 47 лет

? АГ I степени



**Факторы риска:**  
-сахарный диабет  
-гипертрофия левого желудочка

# МЕТА-АНАЛИЗ ANTITROMBOTIC TRIALISTS' COLLABORATION

Прием ацетилсалициловой кислоты для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний



**-19%**

Снижает риск ишемического инсульта у женщин на 19%<sup>1,2</sup>

# ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЖЕЛУДОЧНО РАСТВОРИМЫХ ФОРМ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ<sup>1</sup>



Желудочнорастворимые формы ацетилсалициловой кислоты (**Кардиомагнил**) характеризуются **более быстрым и выраженным антиагрегантным эффектом**

# КАРДИОМАГНИЛ В 3 РАЗА ЭФФЕКТИВНЕЕ




Кардиомагнил в 3 раза эффективнее подавляет агрегацию тромбоцитов, т.е. предотвращает образование тромбов, чем кишечнорастворимые формы ацетилсалициловой кислоты<sup>1</sup>

- Вставить упаковки и инструкцию



# КАКОЙ ПРЕПАРАТ НАЗНАЧИТЬ ПАЦИЕНТУ?



? 52 года

? АГ II степени



**Факторы риска:**  
- ожирение  
- дислипидемия

Назначение ацетилсалициловой кислоты необходимо пациентам с АГ  
с высоким сердечно-сосудистым риском  
для снижения числа сердечно-сосудистых событий<sup>1</sup>

АГ 2 ст. САД 160-179/ ДАД 100-109



Любые 2 фактора риска



Мужской  
пол



М>55 лет,  
Ж>65 лет



Дислипидемия




Курение



Ожирение



Гипертрофия  
левого желудочка



Сахарный  
диабет




Семейный  
анамнез ССЗ



1 таблетка 75 мг 1 раз в день

# КАРДИОМАГНИЛ РЕЖЕ ВЫЗЫВАЕТ ЯЗВЫ ЖКТ И ГАСТРИТЫ<sup>1</sup>



Буферсодержащие формы ацетилсалициловой кислоты (Кардиомагнил) реже вызывают язвы ЖКТ и гастриты<sup>1</sup>



- Вставить упаковки и инструкцию

# КАКОЙ ПРЕПАРАТ НАЗНАЧИТЬ ПАЦИЕНТУ?



? 52 года

? Ишемический инфаркт мозга  
в 2010 году

? Принимает кишечнорастворимую АСК



**Проблема:**  
- изжога при приеме  
кишечнорастворимой АСК

# ЖЕЛУДОЧНОРАСТВОРИМАЯ БУФЕРСОДЕРЖАЩАЯ ФОРМА АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ



БУФЕР

**МАГНИЯ ГИДРОКСИД<sup>1</sup>**  
снижает концентрацию  $H^+$   
в микроокружении таблетки

Ускоряет всасывание  
ацетилсалициловой кислоты




АНТИАГРЕГАНТ

**АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА<sup>2</sup>**  
Блокирует тромбоксан A2

Предотвращает  
образование тромбов

# КАРДИОМАГНИЛ РЕЖЕ ВЫЗЫВАЕТ ИЗЖОГУ, ТОШНОТУ, ДИАРЕЮ



**Кардиомагнил реже вызывают изжогу, тошноту, диарею, чем кишечнорастворимые формы ацетилсалициловой кислоты<sup>1</sup>**

- Вставить упаковки и инструкцию