

КАКОЙ ПРЕПАРАТ НАЗНАЧИТЬ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНСУЛЬТА?



? 47 лет

? АГ I степени



Факторы риска:
-сахарный диабет
-гипертрофия левого желудочка

МЕТА-АНАЛИЗ ANTITROMBOTIC TRIALISTS' COLLABORATION

Прием ацетилсалициловой кислоты для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний



-19%

Снижает риск ишемического инсульта у женщин на 19%^{1,2}

ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЖЕЛУДОЧНО РАСТВОРИМЫХ ФОРМ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ¹



Желудочнорастворимые формы ацетилсалициловой кислоты (**Кардиомагнил**) характеризуются **более быстрым и выраженным антиагрегантным эффектом**


КАРДИОМАГНИЛ В 3 РАЗА ЭФФЕКТИВНЕЕ



Кардиомагнил в 3 раза эффективнее подавляет агрегацию тромбоцитов, т.е. предотвращает образование тромбов, чем кишечнорастворимые формы ацетилсалициловой кислоты¹

- Вставить упаковки и инструкцию

КАКОЙ ПРЕПАРАТ НАЗНАЧИТЬ ПАЦИЕНТУ?



? 52 года

? АГ II степени



Факторы риска:
-ожирение
-дислипидемия

Назначение ацетилсалициловой кислоты необходимо пациентам с АГ
с высоким сердечно-сосудистым риском
для снижения числа сердечно-сосудистых событий¹

АГ 2 ст. САД 160-179/ ДАД 100-109



Любые 2 фактора риска



Мужской
пол



М>55 лет,
Ж>65 лет



Дислипидемия



Курение



Ожирение



Гипертрофия
левого желудочка



Сахарный
диабет



Семейный
анамнез ССЗ



1 таблетка 75 мг 1 раз в день

КАРДИОМАГНИЛ РЕЖЕ ВЫЗЫВАЕТ ЯЗВЫ ЖКТ И ГАСТРИТЫ¹



Буферсодержащие формы ацетилсалициловой кислоты (Кардиомагнил) реже вызывают язвы ЖКТ и гастриты¹

- Вставить упаковки и инструкцию

КАКОЙ ПРЕПАРАТ НАЗНАЧИТЬ ПАЦИЕНТУ?



? 52 года

? Ишемический инфаркт мозга
в 2010 году

? Принимает кишечнорастворимую АСК



Проблема:
- изжога при приеме
кишечнорастворимой АСК

ЖЕЛУДОЧНОРАСТВОРИМАЯ БУФЕРСОДЕРЖАЩАЯ ФОРМА АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ



БУФЕР

МАГНИЯ ГИДРОКСИД¹
снижает концентрацию H^+
в микроокружении таблетки

Ускоряет всасывание
ацетилсалициловой кислоты




АНТИАГРЕГАНТ

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА²
Блокирует тромбоксан A2

Предотвращает
образование тромбов

КАРДИОМАГНИЛ РЕЖЕ ВЫЗЫВАЕТ ИЗЖОГУ, ТОШНОТУ, ДИАРЕЮ



Кардиомагнил реже вызывают изжогу, тошноту, диарею, чем кишечнорастворимые формы ацетилсалициловой кислоты¹

- Вставить упаковки и инструкцию