

# Задача Пифагора

«*Всякое нечётное число, кроме единицы, есть разность двух квадратов.*»


**Решение задачи:**

$(n+1)^2 - n^2 = (n+1-n)(n+1+n) = 2n+1$  — получили нечётное число



*В школе Пифагора эта задача решалась геометрически. Действительно, если от квадрата отнять гномон, представляющий нечётное число (на рис. выделено цветом), то в остатке получится квадрат, т.е.*

$$2n+1 = (n+1)^2 - n^2$$





# Формулы сокращенного умножения

## Разность квадратов

*Тема урока*






Использовать формулы  
сокращённого умножения  
для рационального счёта;

*Учебные цели*



## Упражнение 2

Выберите рисунок, иллюстрирующий тождество  $(a + b)(a - b) = (a^2 - b^2)$



## Упражнение 3

Решите уравнение.

$$(x + 2)(x - 2) - (x - 3)x = 2;$$

Ответ:

$$(y + 3)(y - 3) = (y - 1)^2;$$

Ответ:

Вычислите:

1)  $15,2 \times 14,8$

3)  $4,01 \times 3,99$

2)  $19,9 \times 20,1$

4)  $29,8 \times 30,2$

Выполните действия:

$$1) \ a^2 + a^2 \cdot a^2 - a^2$$

$$3) \ 10a^2 - a^2 \cdot 10a^2 + a^2$$

$$5) \ 5a^2 + 2a^3 \cdot 2a^3 - 5a^2$$

$$2) \ a^3 - a^3 \cdot a^3 + a^3$$

$$4) \ a^4 + a^2 \cdot a^4 - a^2$$

$$6) \ 1,4a - 0,7a^3 \cdot 1,4a + 0,7a^3$$