

ПЗ № 4

Методы лучевой диагностики
заболеваний ГПДЗ.

Лучевая анатомия, физиология и
семиотика

::Вопрос 1::

**Желчный пузырь при УЗИ
дифференцируется как :**

1 - эхопозитивное образование

2 - эхонегативное образование

::Вопрос 2::


**Мероприятия по подготовке пациента к
лучевому обследованию желчного пузыря:**

1 - подготовки не требуется

2 - устранить метеоризм, легкий завтрак

3 - устранить метеоризм, исследование
натошак


4 - представить холецистограмму для
определения топографии желчного пузыря



::Вопрос 3::

Определите метод исследования:


- 1 - позитронно-эмиссионная томография
- 2 - магнитно-резонансная томография
- 3 - компьютерная томография
- 4 - УЗИ



::Вопрос 4::

**Стрелка указывает
на:**

- 1 - правую долю
печени
- 2 - левую долю печени
- 3 - ворота печени
- 4 - селезенку
- 5 - желчный пузырь



::Вопрос 5::

Определите метод исследования:

- 1 - позитронно-эмиссионная томография
- 2 - магнитно-резонансная томография
- 3 - компьютерная томография
- 4 - УЗИ

::Вопрос 6::

Назовите метод, являющийся на сегодняшний день ведущим в диагностике заболеваний желчных протоков:

1 - холеграфия

2 - холецистография

3 - холангиография

4 - ЭРХПГ

5 - УЗИ

::Вопрос 7::

Установить соответствие.

Объект исследования: желчевыделительная функция печени. Основные методы лучевой диагностики:

1 - КТ

2 - холецистография

3 - гепатобилисцинтиграфия

4 - УЗИ, холецистография

5 - УЗИ

::Вопрос 8::

**Вторичные злокачественные опухоли
печени визуализируются на гамма-
топограммах как:**

1 - “холодные очаги”

2 - “горячие очаги”

::Вопрос 9::

При синдроме портальной гипертензии лучевое исследование начинают с :

1 - эзофагографии

2 - УЗИ брюшной полости

3 - рентгенографии брюшной полости

4 - диагностического пневмоперитонеума

5 - спленопортографии

::Вопрос 10::

Наиболее информативной методикой исследования билиарной системы при желчекаменной болезни является :

1 - РХПГ

2 - УЗИ

3 - внутривенная холецистохолангиография

4 - инфузионная холеграфия

::Вопрос 11::

**Минимальный размер конкрементов желчного пузыря,
выявляемый при УЗИ:**

1 - 0.1 мм

2 - 1.5-2 мм

3 - 5-7 мм

4 - 1 см

5 - 3 см

::Вопрос 12::

При подозрении на опухолевое поражение печени наиболее информативной методикой является :

- 1 - обзорная рентгенография брюшной полости
- 2 -МРТ
- 3 - контрастное исследование билиарной системы
- 4 - сцинтиграфия
- 5 - УЗИ

::Вопрос 13::

Установить соответствие.

Объект исследования: оценка морфологии желчного пузыря. Основные методы лучевой диагностики :

1 - КТ

2 - холецистография

3 - гепатобилисцинтиграфия

4 - УЗИ, холецистография

5 - УЗИ

::Вопрос 14::

Установить соответствие.

Заболевание: печеночная и обструктивная желтухи.

**Основные методы лучевой
диагностики :**

1 - УЗИ, холеграфия

2 - УЗИ, КТ, МРТ

3 - КТ

4 - целиакография

5 - КТ, холесцинтиграфия

::Вопрос 15::

Наиболее достоверными ультразвуковыми признаками камней являются :

- 1 - гиперэхогенные образования с акустической тенью, перемещающиеся при перемене положения больного
- 2 - гиперэхогенное образование без акустической тени
- 3 - пристеночное гиперэхогенное образование, не смещающееся при перемене положения тела больного
- 4 - образование неоднородной структуры без акустической тени

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ

Методы лучевой диагностики заболеваний ГПДЗ.

Лучевая анатомия, физиология и семиотика .

1. 2
2. 3
3. 3
4. 2
5. 2
6. 4
7. 3
8. 2
9. 1
10. 2
11. 2
12. 1
13. 1
14. 1
15. 1