

ДЕД МОРОЗ И КОНФЕТЫ

Мнимый парадокс
бесконечных множеств.

Нумерованное множество конфет: $A = \{x \mid x \in \mathbb{N}\}$

При $t = \frac{1}{2^0}$: {№1} у детей;

При $t = \frac{1}{2^1}$: {№2, №3} у детей, {№1} у Деда;

При $t = \frac{1}{2^2}$: {№4, №5, №6, №7} у детей,

{№1, №2, №3} у Деда;

...

При $t = \frac{1}{2^n}$: {№(2^n), №($2^n + 1$), ..., №($2^{n+1} - 1$)} у

детей, { 2^{n-1} , $2^{n-1} + 1$, ..., $2^n - 1$ } у Деда.

Количество конфет у детей с каждым разом удваивается

За минуту до полуночи, каждые

$t = \frac{1}{2^n}$ минут :

1) даёт

$2^n, 2^n + 1, \dots, 2^{n+1} - 1$ -ые конфеты;

2) забирает

$2^{n-1}, 2^{n-1} + 1, \dots, 2^n - 1$ -ые конфеты.

У кого конфета $\{m \in A\}$?

Если

$$\exists \{n \in \mathbb{N} \mid 2^{n-1} \leq m \leq 2^n - 1\},$$

то конфета \mathbf{Nom} у Деда \Rightarrow

при $\mathbf{t=0}$:

A ∈ Дед Мороз.

Вывод

Не всегда можно
полагаться на
интуицию.

Fin